



19.8.117


PROPERTY OF THE  
PUBLIC LIBRARY OF THE  
CITY OF BOSTON,  
DEPOSITED IN THE  
BOSTON MEDICAL LIBRARY.

No 3801.15



GIVEN BY

Walter Channing, M.D.









To Doctor Chauncy  
With great respect, from the  
Author

---

DISPUTATIO PATHOLOGICA

INAUGURALIS,

DE QUIBUSDAM

CEREBRI TUMORIBUS.

---





DISPUTATIO PATHOLOGICA

INAUGURALIS,

DE QUIBUSDAM

CEREBRI TUMORIBUS;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,

D. GEORGII BAIRD. SS. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

ABRAHAMUS SOLOMON,

Anglus: 3801.15

COLLEGII REGII CHIRURGORUM LONDINI SOCIUS.

---

---

*Pridie Idus Septembris, hora locoque solitis.*

---

---

EDINBURGI:

EXCUDEBAT C. STEWART,

Academiæ Typographus.

---

MDCCCX.

REPORT OF THE

COMMISSIONER

OF THE

GENERAL LAND OFFICE

RECEIVED  
GENERAL LAND OFFICE  
WASHINGTON  
MAY 10 1856

14039

Hester Shaming D. S.  
Apr. 18, 1856

PATRI MEO DILECTO,

CURAE PATERNAE MEMOR

QUA ME VIRTUTIS ET SCIENTIAE

AMORE INSTITUERE


SEMPER SOLICITE CONATUS EST,

HANC DISPUTATIONEM INAUGURALEM,

ANIMO GRATISSIMO

SACRAM VOLO

ABRAHAMUS SOLOMON.



VIRIS EXIMIIS  
THOMÆ RENWICK, M. D.

ET  
JACOBO VOSE, M. D.

DE LIVERPOOL,

S. P. D.

AUCTOR.

AMICI carissimi, hoc opusculum patrocinati, simul meos conatus illustrastis, et occasionem praebeuistis studium erga vos publice ostendendi. Jam diu vestram amicitiam expertus, exemplo imitando et consiliis optimis, ad vitam mihi praeclaris laboribus honestandam, incitor. Spero cupiditas bene de talibus bonis et sapientibus merendi, mihi in futurum illum amorem conciliaret, quo juvenem adhuc fovistis. Vobis sacravi hanc disputationem, cum illius benevolentiae memor, qua me dignati estis, et virtutes et ingenium admiratus, quae vobis per omnia vitae officia enitent, tum etiam ut aliquid famae huic operi acquirerem, prorsus alienae ab ejus pretio, qualecunque sit, uti de quaestione chirurgica conscriptae. Toties vero mihi proficiendi desiderium, exhibuistis, ut non simul meas voluntati et utilitati consulere nolletis. Semper animo et corpore felicibus perfruamini, solícite precor. Valet.

*Edinburgi: Pridie Idus Sept. MDCCCX.*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

PROBLEM SET 1

1. A particle of mass  $m$  moves in a potential  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ . The energy of the particle is  $E$ . Find the period of oscillation.

2. A particle of mass  $m$  moves in a potential  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}bx^4$ . The energy of the particle is  $E$ . Find the period of oscillation.

3. A particle of mass  $m$  moves in a potential  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}bx^4 + \frac{1}{6}cx^6$ . The energy of the particle is  $E$ . Find the period of oscillation.

4. A particle of mass  $m$  moves in a potential  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}bx^4 + \frac{1}{6}cx^6 + \frac{1}{8}dx^8$ . The energy of the particle is  $E$ . Find the period of oscillation.

5. A particle of mass  $m$  moves in a potential  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}bx^4 + \frac{1}{6}cx^6 + \frac{1}{8}dx^8 + \frac{1}{10}ex^{10}$ . The energy of the particle is  $E$ . Find the period of oscillation.

## PRAEFATIO.

---

**H**oc opere conficiendo, mihimet proposui rei medicae expertos ducere ad studium proprium quorundam tumorum, qui nondum videntur satis accurate fuisse definiti; et quorum natura hucusque tenebris implicatur.

Inquisitionis igitur, quam suscepi, finis est, praesertim ostendere, scriptores medicos iis vocibus, *Hernia et Fungo Cerebri* confuse et sine idoneo discrimine usos esse, ad pleraque mala designanda, quae, naturam, causas et curationem, re perpensa, plurimum inter se discrepare, et contraria esse, apparent; ideoque haec mala, indagationem accuratam et acerrimam medicorum desiderare.

Ad propositum rite exequendum, *inductioni* verae mihi visum est potissimum insistere; rebus ipsis, unde ratiocinatus sim, auctoritate spectatissima innixis.

Inter hanc rationem sequendam, quamvis nunc usitatissimam inter scientiae cultores, difficile erit non vi-

deri paulo audacius et arrogantius sententiis virorum magni nominis adversari. Defensionem vero e verbis facundi illius Burke mihi deducere liceat: "to exert reason is not to revolt against authority; reason and authority do not move on the same parallel." Haud dubitandum est quin ingenio et literis exornatos colere, et ad eorum iudicium quaestiones referre, sit observantiam et reverentiam debitas persolvere: mentem vero in rebus momentosis auctoritati meri nominis submittere potius habendum est ingenii hebetis, quam sinceræ modestiæ aut sapientiæ. Quæ sentiunt medici insignes in medium prolata, nequeunt non longe et late accipi, aut non maxime in curatione morborum valere, admodum aut laesura aut adjutura; quæ ideo, accerrime, vera sint an falsa, quaerendum; neque talis inquisitio sane vana aut inutilis aestimanda. Quocirca, confido lector ingenuus mihi facile ignoscat, quod paulo liberius virorum jure summi habitorum sententias inquisiverim; quorum ingenium lubenter idonea estimatione habeo, et quibus grates ago, pro scientia, quam, eorum scriptis perlectis, arripui.

Hac vero ratione argumentum tractandum.

I. Quaedam generalia praefanda, quæ doceant, quantum necesse est vetusta capitis icti curatio valuerit ad tumores, de quibus scribere statui, pariendos; et



simul quaedam observanda de tenui ista et inepta oratione, qua plerique scriptores eorundem naturam perstrinxerunt.

II. Brevi sermone proferenda, quae huc pertinentia e libris scriptorum nuperorum celebrium sint excerpenda; quibus accedere licet quaedam exempla non antehac in lucem edita, quae mecum amici spectatissimi benigne communicarunt.

III. et IV. Perscrutandae erunt horum tumorum propria natura, causae et curatio; ut inde invicem collati discernerentur, et ad classes proprias referrentur.

V. Quaedam adjicienda, de Fungo Durae Matris, morbo, qui cum tumoribus, de quibus disputavi arcte committitur.

VI. Denique, huc accedunt ANNOTATIONES, ampliores, quam quas convenisset propriis paginis subjicere; et APPENDIX, exempla, de quibus dixi, sermone ampliore et proprio complectens; quorum scilicet descriptionem longam alicubi protulisse haud incommodo vacasset.

*It appears very probable that the disease, generally described by the term hernia cerebri, consists of a tumour formed by coagulated blood; for an organized fungus could hardly be produced in so short a time as that in which these tumours are usually formed.*

Abernethy's Surgical and Physiological Essays,  
Part III. p. 40.

---

*There may perhaps be tumours of various kinds, arising from the pia mater and brain; but if there are such, I believe they have not been discriminated; nor have I found an account of any in the writings of authors, which did not resemble those I have described. They have generally been treated of under the name fungus, or hernia cerebri, &c.*

Idem, p. 44.

DISPUTATIO PATHOLOGICA  
INAUGURALIS  
DE QUIBUSDAM  
CEREBRI TUMORIBUS.

---

---

AUCTORE ABRAHAMO SOLOMON.

---

---

CAPUT PRIMUM.

SECTIO I.

SCIENTIAM nullam utilem esse, aut exquisita dignam, nisi qualis humani generis felicitati conciliandae, aut malis levandis accommodatur, adeo manifestum est, ut plena oratione idem protulisse supervacuum esset. Nihil vero majoris est momenti hominibus, quam quicquid

ad sensum et intellectum pertinet: ideoque mala, quibus horum instrumenta opportuna sunt, medicis potissimum sunt excolenda. Proinde cultores artis salutiferae semper ingenia exercuere in malis, quibus cerebrum patet, indagandis. Opera Hippocratis, Aretaei et Celsi ex antiquioribus; Morgagni vero, Haller et Baillie inter recentiores, hujusmodi scientiae sunt uberissima; neque parum huic rei lucis attulerunt. Tantum laudis accuratio et acies quaesitissima, et diligentia his scrutatoribus merito conciliarunt, ut hodie etiam eorundem opera soli fere commentarii existimantur, unde harum rerum studiosi scientiam exquirerent. Non possumus igitur non plurimum admirari, inter tantam abundantiam, qua haec opera ditantur, tantulum inveniendum esse de tumoribus, qui FUNGI vel HERNIAE CEREBRI vocari solent.

Inter initia, dum homines inculti rei chirurgicae rudes erant, ratio inhabilis, quae invaluit, caput laesum curandi, necesse est haud raro hanc gravem cerebri noxam genuerit: quo tempore scilicet, medici consilium, quid manu vul-

nerarius molliatur, decrevit. Nondum corporis humani fabrica fuerat intellecta ; aut miris, quibus obsequitur, legibus, aut vitae principii dotibus, ea inventa praeclara lucem affuderant, quibus ingenium nuperorum celebrium medicinam auxit et ornavit.

Viri antiquiores, incitia et barbarie obruti, eo carentes auxilio, quo tanto fructu recentiores nixi sunt ; nimirum, sani aut aegri corporis humani structura et legibus compertis, certi consilii egeni, aliquid subsidii petere conati sunt, acriter inspectis ossium figura, ordine, fabrica, horumque fere sorde corruptorum, et multo post exequias effossorum : quam solum *anatomes* partem perscrutari et cognoscere tunc temporis licuit.

Nusquam vero antiqui vulnerarii pejus curarunt, quam ubi ea tenui et manca de ossium fabrica scientia, ad icti capitis rationem et curationem exponendas, uterentur. Quanquam amplissime de his rebus scripserint, contra tamen artis medendi profectum, omnia fere consilia et curationes instruxerunt, non injuriae ipsi

cerebro ictu illatae, sed figurae, ordinis et fabricae ossium calvariae ratione habita. Perperam igitur et imperite ea perobscura luce, quam fuerant adepti, usi sunt. Hinc varias calvariae formas et proprietates, aliis alias, intellectu dignissimas judicarunt, prae quibus variantibus, ossium fracturas multiplicis esse generis statuerunt. Hinc studio acerrimo rimam ossis fissi a sutura discernere sunt conati: hinc, porro, osse fisso, aut scisso et intus subsidente, nunquam non ferramentis utendum existimarunt.

Talem igitur medicinam chirurgicam apud veteriores nobis contemplantibus facile videretur, eos mori temporum obsequentes famam persequi solitos esse, plurimis istis et multiplicibus manus et ferri laboribus, quos inepte ingeniosi invenerant, perite exactis. Inter hanc inscitiam, ubi medici consilium ante initum, quid manus artificis faceret, imperavit, in omni capitis percussi injuria, semper ferramentis uti solebant: maxima opera, os necne finderetur, exquirebant; rimam jam detectam ferro ampliarunt; os si dens, etiam levissime, arte levarunt; et saepe,

quae calvariam tegunt, imo *pericranium*, ample sustulerunt, ipsa patefacta vel etiam sublata; neque contenti esse consuerunt, quod memoratu dignum, ni tandem, ut os explicetur, fecissent<sup>a</sup>. Quae quantum necesse est curatio nocuerit, jam diu (rei medicae felicissimum, et summa laus nostris temporibus), obsoleta et rejecta, cuique, re perpensa, lucide patebit. Rete vasorum multiplex, quo integumenta, *pericranium*, ipsa calvaria, et dura mater consociantur, ferro dissolutum, non graviter nocere non potuit: et quia curantes amplissime calvariam patefacere solebant, integumentis vel ictu antea partim disruptis et dissolutis, vel prorsus ferramento, ad subjecta introspectienda, quo postea melius calvariam perterebrare intelligerent, dura mater inde saepe non graviter inflammari nequibat<sup>b</sup>. Vasa, quibus haec haeret calvariae, rupta, et tutamen, quod cerebrum e calvaria cingente et quasi fulciente capit, sublatum, plurimum operae ad tumores, quos prosequor, inferendos contulerunt. Hic profecto multo facilius dura mater inflammabitur; exulceratio, et hujus propria, interdum

sequuntur, et cerebro, inde omni fulcro et adminiculo privato, magna proclivitas efficitur ad horum tumorum ortum. Antiquiores, semper, ut os explicetur, opera summa nixi, vi naturae salutiferae partes dissolutas novare molienti repugnarunt, eoque opportunius cerebrum huic morbo reddidere; quos unde idem scriptis saepius mandasse, statuere licuit; quod tamen contra se habet. Aliquis profecto amplissimam ejus rationem ab eorum scriptis peteret, quorum curatio tantum ad idem gignendum valuit.

Proximum est igitur, ut requiramus, quare chirurgi morbum tantuli fecerint, qui non creberrime accidisse, ut supra docuimus, non potuit. Inter causas, unde tam insignis incuria provenerit, nobis veri simile videtur, principem extare parum honestam consuetudinem ea solum hujus malae curationis exempla memorandi, quae feliciter desierint; infelicibus, certe non paucis, omissis. Veteres et quidam recentiores omnia mala tam arcto vinculo cerebro adjuncta, et ejus munera tantum impediencia ipsi vitae



discrimen minitari existimare soliti, praeter modum solliciti, et prae sua imperitia, semper vani timoris genitrice, artem visceri ad vitae actiones adeo necessario adhibere valde pertimescentes, (quod temerarium, et audacissimum judicarunt) miserum immedicabili malo certo periturum deseruere. Nil mirum igitur, si aestimantes ipsa hujus mali principia medendi artem devictam, ipsumque occisurum indicare, tandem defatigati de malo conticuerint, quod lethale persuaserat inscitia, effecerat inepta curatio.

## SECTIO II.

Eo fusius disserui de prava cerebri et calvariae curatione hunc morbum crebriorem pariente, quod Hill optimi ingenii scriptor, qui nuper summa laude Dumfreiae medicinam fecit, quo florente, nondum veteres errores obsoleverant, longe plurium exemplorum tumorum cerebri meminit, quae ipsi unico curare contigerat, quam quae quivis alius, quantum scio, praeterea. Lugendum vero ne hunc quidem eximium

virum, auctorem magnae laudis, et plurimi inter medicos habitum, speciem, indolem propriam aut externas notas horum tumorum depinxisse, quos toties inter curandum cognoverat, et ad sanitatem duxerat. Eo quod de his prorsus siletur, maxime admiror. Etiamsi vero omnium fere medicorum libri rei tam gravis sint adeo steriles, et quasi conticeant, grates tamen huic auctori persolvendum, qui tot edidit horum tumorum exempla: quod vero hos minoris habuit, eoque vix operae pretium hujus mali naturam perscrutari sensit, deplorandum. Scriptorum ejus studiosi spe destituuntur, quod medicus eruditus, ingenuus, artis medicae peritissimus, scientiaeque ornandae et augendae cupidus, tantis copiis et occasionibus praeditus, penitus hanc gravem argumenti partem omiserit.

Nihil vero omnino magis vetuit, quo minus horum tumorum periculosorum naturam detegamus, quam infelix ista consuetudo, scientiae provehendae inimicissima, quae tantum inter auctores invaluit, leges certas instituendi et sententias firmandi ex iis, quae pauca et abnormia

exempla docuerint ; qua, unico forsitan exemplo, morbi naturam, qualem semper induit, statuunt. Si quis animo etiam leviter prosequatur Fungi Cerebri descriptiones quas protulerunt viri eximii Abernethy et Carolus Bell, quod dixi, verum esse perspiciet; lugebit perspicuens hos celebres viros raris fretos exemplis, temere de hac re judicasse; prae ingenio, doctrina usuque multo, aliter naturae hujus tumoris explicandae habilissimos. Perlectis sane medicorum libris, tot et tam inter se diversas sententias jure miramur, et pertinax istud studium, quo suum quisque prosequitur. Nullo super argumento tam obscure disputarunt; nunquam verba tenebris altioribus amicuerunt, aut ipsi magis hallucinati sunt, e vanis rationibus, prius temere acceptis, fonte errorum feracissimo, ratiocinati. Saepe medicis vitio versum est, quod omnia stricto sermone definiendi justo magis studiosi sunt. Hoc vero orationis genus, quo breviter et lucide morbi et quae ad *anatomem* pertinent, ordinantur et definiuntur, omnibus superfluit inimicis. Si ad propositum morbum ani-

num appellamus, si quam inconcinne de eo medici egerunt, alii alias sentientes, si quam absurda nomina apposuere, observemus, fere suspicamur eundem istam habere difficilem naturam, ut intra limitem, quo solet contineri definitio, ejus descriptio non sit cohibenda.

Ubicunque licet ex idoneis principiis rerum distinctiones perspectas instituere, necesse est inde scientia multum proficiat. Collatis igitur inter se aliis atque aliis hujus morbi rationibus, quas singuli e paucis exemplis duxerunt, liceat, ni fallor, memet accingere ad hos tumores inter se discernendos, eorumque genera diversa statuenda; (quod nemo adhuc, ut existimo, perfecit) quantum e libris parum sane lucidis, aliisque auxiliis, haec potui cognoscere.

Hoc consilio, quaedam exempla subjiciendum, e scriptis maxime insignium inter hodiernos excerpta, qui animum ad hoc malum indagandum appulerint.

---

---

**CAPUT SECUNDUM.**

CEREBRI tumores, de quibus scribere proposui, nuper acriori studio prosecuti sunt Abernethy et Carolus Bell; et quae tam praeclari viri de iisdem sentiant, nequeunt non plurimum apud medicos valere; in capite proximo brevissime exposui res ipsas quas observarunt, et rationes inde deductas; subjectis binis exemplis oratione tenuissima enarratis, neque antehac in lucem editis. Appendix ipsa exempla sermone vernaculo fusius descripta complectitur.

**SECTIO I.**

Imprimis illa exempla, quae Abernethy protulit, memorandum.

*Exemplum primum.*—Quatuordecim annos nato, qui praeceps e tabulato deciderat, ossa frontis et parietis multum siderant. Parte cal-

varie sublata, plurimum cruoris infra inveniebatur, cerebrum et duram matrem opprimens. Sanguis, qui, cruore remoto, fluxit, ex arteria meningeae magna rupta proficisci videbatur: calvaria ter terebrata est, quo nudaretur arteria vulnerata, et calvariae pars ante dura matre privata tolleretur. Tertio ossis circulo terebra remoto, cerebrum ad sedem justam assurrexit, et sanguis fluere desiit. Dein parte calvariae, quae intus siderat, evulsa, patefiebat durae matris, quantum e calvaria fuerat disjunctum.

Aeger initio sensus expers, inquires nunc se jactare coepit, et tandem dolorem fuit questus. Tunc sanguis ad XII uncias eliciebatur; postero die mane, alvo plenius purgata, medicamenta *salina* cum praeparatis e stibio dabantur. Interdium quaerentibus prudenter respondit, sed capitis questus est dolorem et vertiginem: die III magis turbatus fere deliravit. Sanguinis VIII unciis detractis, et exulceratorio cervici admoto, melius se habuit, inde tranquillatus. Die VI incitatio et irritatio redeuntes iisdem remediis iterum cesserunt: dura mater sanescere coepe-

rat, et omnino vulnus ad sanitatem spectavit. Omnia feliciter usque ad diem xv processerunt; quo tempore, invasere rigor et dolor capitis; sana vulneris specie maligna mutata.

Postridie, pars durae matris patefacta in medio hiare reperta est. Hoc hiatu ascendit et prominuit cerebrum pia matre obductum, visuque prorsus integrum: intra viginti quatuor horas tumor eo increverat, ut malum aureum mole aequaverit: facies ejus nigricare coepit, inaequalis; neque pia mater discerni potuit. Postridie mane aeger obiit, prius elatus quam eum mortuum esse Abernethy cognoverit\*.

*Exemplum secundum.*—Quadragenario, quem saxum humi stravit, multum ossis parietis prope

---

\* De infelici hujus exempli eventu hujuscemodi habet Abernethy verba: “ I regretted very much that I  
“ could not examine the nature of *this Fungus or Hernia Cerebri*, as it was a phenomenon which I had more  
“ than once contemplated with surprise, *and the nature*  
“ *of which I was afterwards fortunately enabled to as-*  
“ *certain.*”

Vide *Surgical and Philosophical Essays, Part III. p. 27.*

suturam coronalem intus sedit. Parte ossis sublata, et calvaria dein arte levata, stupor abiit. Die II, iniquies deliravit; exinaniendo vero et capite exulcerando, mala decrevere, neque tamen quievit: sex dies graviora aut leviora perstiterunt; vires nunc admodum labarunt; stupore indies aucto accedente. Die x, vulnere patefacto, tumor per hiatum dura matre exulcerata factum prominere coepit; mole ovum columbae aequavit, pia matre cingente inflammata, et sero crasso sub dura matre manante: die proximo, tumor eo increverat, ut ovum gallinaceum magnitudine retulerit, laevis; et parum abesse videbatur, quin rumperetur. Die XII, aeger obiit. Tumor inspectus ampliatus esse, et nigricasse apparuit, facie inaequali et granata, ut videbatur, e sanguine coacto in eam effuso. Pia mater admodum inflammata esse, et, ut ipsa dura mater apud tumorem, deesse, visa est. Pars tumoris excisa e sanguine coacto et fibrato componi, et cerebro seposito, et inspecto, totus tumor istiusmodi esse, apparuit; pollicem infra superficiem alte exortus. Hinc constat malum,



cui homo succubuit, piae matris inflammationem fuisse: patuit etiam natura tumoris; cerebro scilicet altius laeso, malum ad vasa serpsit, et sanguis inde profluxit. Constat cerebri partem et membranas incumbentes aliquamdiu fluxum cohibuisse, has vero tandem renitendi impotentes cessasse, sanguinem profluxisse et ad superficiem coisse.\*

*Exemplum tertium.*—Fabrum lignarium valde contudit maceria delapsa. Praeter alias injurias, osse parietis dextro fracto et intus presso, paulum aeger stupuit multis horis postquam ad valetudinarium fuerat vectus; rite tamen interrogantibus respondit. Perterebrata calvaria, os elatum est; nihil sanguinis duram matrem tegere fuit conspectum.

Eodem die et 11<sup>do</sup> et 14<sup>to</sup> postea, sanguis, incisa vena, large elicitus est, epotis simul medicamentis refrigerantibus, cum paratis e stibio et opio, aeger ad salutem spectare videbatur usque ad diem XII<sup>mum</sup>; quo tempore tumor

---

\* Surgical and Physiological Essays, Part 3d. p. 37.

per hiatum durae matris ex adverso calvariae perterebratae partis exortus est. Celerrime increvit, et tumorem in secundo exemplo descriptum penitus retulit; biduo post decessit aeger. Secto cadavere, dura mater ubique calvariae adhaerescere, intus vero pure madefieri, apparuit. Tumor, qui per hiatum exulceratae durae matris extiterat, e fibris repertus est componi, sanguine coacto plane confectus, qui in parte cerebri medullari concreverat. Cavi, quod implevit, linea media pollicem fuit longa, cerebro ibi loci compressione densato cincti. Ventriculi cerebri sero cruento scatuere\*.

---

Exemplis supra numeratis fretus, tales tumores parte concussa aut contusa, et vasis sanguineis, sic ut in apoplexiâ affectis, Abernethy enasci judicat†. Existimat, hoc vasorum malo increscenſe, unum aut plura vasa dirumpi et

---

\* Surgical and Physiological Essays, Part 3d. p. 40.

† Idem, p. 44, et sequent.

sanguinem in cerebrum profundi; putat, ni, rebus ita se habentibus, calvaria hiatu gauderet, apoplexiam iri secutum; et hunc ut sanguis effusus emeretur, et cerebrum ejusque tunicae extenderetur, permittere; porro, duram matrem cito exulcerari; et tumorem nunc exurgentem eo magis et celerius adaugescere, quo magis et celerius sanguis intus profluat.

Pauca de morbi curatione Abernethy disseruit. E sententia, quam de morbi natura complectitur, tumorem comprimi vetat; ulcere solum oleo vel adipe illito et levi linamento oblecto. Quod si prae grandiore mole tumor molestiam inferat, et compressio vix evitari possit, eum cultro abradi, eadem qua Hill ratione, jubet. Si adhuc tumor increseat, aut notae generis nervosi praeter modum incitati accedant, quae coagulum, ad quod tumorem refert, cerebrum opprimere indicant, calvariae rimam ampliari, pro tumoris amplitudine, suadet. Si vero profusio sanguinis intus fatum minitetur, coagulum subtrahere satius esse existimat, et cerebri cavum patefacere; ut comperiatur, necne sangui-

nis jactura subita et nudata vasa fundentia juvarent, et profluvium compescerent. Aliquam praeterea curationem profuturam negat: a compressione et medicamentis astringentibus adhibitis abhorret.

#### §ECTIO II.

Carolus Bell nulla exempla tumorum cerebri, de quibus dissero, in lucem protulit; sed paulo fusius, quid de eorundem natura senserit, exposuit.

Malum\*, quod ei bis observare contigit, longe aliud atque Abernethianum existere iudicat; et calvariae hiatus et durae matris exulcerationem semper hos tumores antecedere. Opinatur, magna calvariae parte terebra aut carie sublata, aut resoluta, aut terebra admota, et dura matre per serram laesa, aut denique margine calvariae perterebratae aspero et acuto, neque ut fas est, polito, duram matrem, prae cerebri pulsu, ossi aspero illisam partim incidi, partim exulcerari. Hic loci tutamen cerebri proprium tollitur, et e parte ejus morbosa et exulce-

\* Operative Surgery, Vol. I. p. 427, et sequent.

rata membrana *fungus* tener assurgit; et interdum fortasse pars ipsius cerebri initio prominet. Tumore eminente, simul exulceratur cerebri superficies; e cujus parte morbida, idonea compressione deficiente; *fungus luxuriosus* oritur: et interdum cerebri mollis superficies cedens dirumpitur, fortasse tussiendo; unde tumor enascitur. Bell tumorem secuit Abernethiano simillimum; ubi, cerebro circa ejus radicem inciso, sanguis, quasi maculae, effusus esse conspicietur: quas aliquis facile judicaret uno e vasis amplioribus renitendi impotente rupto et coagulum fundente enatas esse: quas vero Bell comperit plerisque cerebri exulcerationibus contingere. Abernethy placet vasis interni disruptionem ex ictu illato proficisci; Bell vero morbum calvaria e malo veneris cariosa profectum esse testatur, quae multo post omnino explicita fuerat.

Haec ad tumorem, quem ei testari contigerat, proprie pertinere a Bell existimantur; quae memoravit ad eum ab altero Abernethiano discernendum.

I. E superficie tumoris dilacerati aut secti sanguis effunditur ; neque solum inter dilacerandum, sed postea ; quae certe coaguli non sunt indicia.

II. Collabitur et contrahitur post mortem ; quae vasis eundem sanguineis instrui luculenter insigniunt.

III. In exemplo hujus tumoris arte *anatomica* praeparati (quod ipse vidi), ulcus a fundo ventriculum lateralem petiit, et in externam partem hiavit : nihil tamen coaguli, aut ad superficiem aut in cavis conspectum est.

IV. Non e *lamellis* ad centrum vergentibus, ut coagulum in arteria *aneurismate* imbecilla, componitur : sanguis nunquam ex ejus superficie manat, qui tamen certe vel e vena tumida, quae primo ad cerebri dirumpendas valuerat membranas, manaret ; exurentibus, sic ut caro ulceris spongiosa, afficitur : Quando semel ad amplam molem pervenerit, compressione magnae arteriae idonea non subigitur.

V. E fibris constat et morte resolutus pen-

det frustulentus; nihil autem hujusmodi sanguis coactus ostendit.

VI. In exemplo jam dicto tumoris quem arte Bell praeparatum conservavit, ea propria ad hoc malum proclivitas non solum ipsius tumoris specie, sed etiam cavi exulcerati margine et interna facie indicatur.

Hoc vero ordine Bell signa Fungi Cerebri, ut ei videtur, propria enunciat.

Paulo post os sejunctum et duram matrem exulceratam, Fungus protrudi caepit: principio et quotidie, sensu adhuc integro, aeger rigores et capitis dolores queritur: vultus squalet, contractus et subflavus. Tumore adaugescente, aeger nausea crebra torquetur; et titubat, ut ebrius: arteriae tarde et imbecille moventur: aeger nunc cubat, non diutius sedendi potens, arteriis potius trementibus quam digitum admodum pulsantibus. Octo fere diebus, morbi cursus conficitur.

Jam dicta ejus indicia sunt calvaria morbo veneris explicita nati. Quia Bell videtur hunc Fungum praesens periculum intentare, eundem

penitus excidi, et dein partem leviter et ubique aequaliter comprimi praecipit. Quinetiam opinatur Fungum prementem et increscentem per magnam vasorum incitationem facessere, per eam cerebri partem, cui adhaerescit; et, ut in aliis exemplis, actio vasorum, projectura tumoris abrasa, sedatur, sic eandem curationem hic adjuturam, exitu puris interni permissa.

Si quando natura ipsa morbo medetur, hoc Bell videtur accidere fungo strangulato, et delapso vel prae suo celeri incremento, vel integumentis et calvaria sanescere pergentibus.

### SECTIO III.

Sequitur ut duo exempla nondum edita breviter memorem; quorum alterius apud valetudinarium Guidianum, alterius Liverpool curati; historias optimus amicus Doctor Vose mecum benigne communicavit: quae summa accuratione, studio et ingenio, quibus enitet, conscriptae omnia magni momenti ad mali progressum pertinentia complectuntur. Haec igitur exem-



pla subjiçio, neque ullus dubito, quin fonte adeo spectato profecta fidem et observantiam debitas acceptura sint.

*Exemplo* in Appendice ample descripto docemur sex annos nato, cui ab excelso lapso pars inferior et anterior ossis parietis fissa erat, plures pollices per inferiorem marginem, calvariam perterebratam esse apud valetudinarium Guidianum Londinense die xxii Julii anno mdcccviii. Inter pertundendum, *perforator* infeliciter altius descendens duram matrem cecidit: calvaria perterebrata, haec membrana visa est admodum prominere et in medio hiare; credito signa cerebri oppressi, quibus puer laboravit, e sanguine inter duram matrem et cerebrum effuso nata esse, cujus paucillum per hiatum manavit, ea membrana lancea incisa est, incisuris rectum angulum inter se continentibus, et cerebro ita patefacto. Nil sanguinis inde prorupit, nisi paululum e vasis piae matris vulneratis, quae duram matrem arcte tetigit. Sanguine e brachio et capite elicito, stupor paulatim abiit. Consecuta est inquietudo, paten-

tibus pupillis; puer subinde mussitavit, rationis expers. Haec signa perstitere diem postea. Die xxiv Julii; nocte praegressa, se multum jactaverat, et interdiu anxius manum porrigere nequivit, et linguam extrudere noluit: pulsus arteriarum lxxxiii: e vena jugulari nunc unctiae octo sanguinis missae sunt. Linteis sublatis, tumor per hiatus terebra factum ad cutem usque ascendisse visus est, convexus, informis, et prorsus cerebri partem pure parce humectatam, et hic illic *fibrina* tectam retulit.


Dominus Astley Cooper, qui tunc interfuit, hunc linamento et strupis linteis emplastro resinoso illitis impositis comprimi suasit; hoc facto, aegro non inde noceri visum est. Die xxv, parum noctu dormiit, continuata jam dicta curatione. Die xxvi, melius dormiit inquires tamen; cutis minus incaluit; arteriae cxxvi<sup>es</sup> et exiliter micuere: tumor pressura decreverat, alias idem atque antea. Vesperi aeger deliravit. Die xxvii: Noctu vigila- bat, crebros edidit clamores, distentionibus agitatus; interdiu vero quietior fuit, mentis

integrior : arteriis cxii<sup>ca</sup> et imbecille micantibus, tumore imminuto. Die xxviii: arteriae cviii<sup>ca</sup> et plenius saluere ; aeger tumorem dolere questus est. Die xxix : arteriae xcvi<sup>ca</sup> et fere naturaliter motae sunt ; tumor triplo minor quam antea, superficiem adhuc tuberibus inaequalem ostendit ; partes eminentes nunc leviter rubuere, intervallis medulla confectis, et pure effluente obtectis. Augusti die i : satis bene se habuit biduo : tumor perrexit decrescere, sed inter tussendum, luctandum et clamandum, remota simul pressura, multum prominuit. Die ii : aeger sensit, et questus est dolorem super oculos, si quando lucem acceperunt ; concitatae sunt arteriae. Die iv : Lux parum doloris facessit. Tumor fere evanuerat, puer aliquantum hebet ; alias integer. Die viii : bonam valetudinem, ut videtur, recepit ; cibos appetivit : tumor nunc contractus ad ipsam duram matrem descendit, parvis rubicundis tuberibus obtectus, iis totius vulneris propriis conterminis : puer cito convaluit, celeriter sanato vulnere, strupis emplastro resinoso illitis cincto ;

sanus domum rediit. Tumore inter curandum presso nullus nervorum affectus enatus est.

*Exemplum secundum.*—Trimus, cui frontem equus calcaverat, ad valetudinarium Liverpool, mense Septembre, anno MDCCCIX, advectus est. Parte ossis frontis ictu semota, quae scissae superfuere, intus siderant. Infans initio stupuit. *Chirurgus* os demissum arte levavit; inter levandum, ossis fragmentum duram matrem transfixisse conspexit; hoc sustulit. Osse levato, sensus rediit; vulnere leviora linamenta imposuit; et omnia feliciter ad diem tertium processere; quo tempore tumor fabricam cerebro similis extra duram matrem adscendere coepit: qui *liquore antiseptico* lotus, nihilo minus paulatim increvit. Postea *cataplasma* diutius adhibitum est; quod inter adhibendum, semel aegrum nervorum distentiones agitarunt. Die Octobris XXIV: Doctor Vose, ita se rebus habentibus, primum interfuit; grandis nunc fuit tumor et externas notas alteri jam memorato simillimus; nimirum, cerebrum pure et *fibrina* obductum retulit. Exinde Doctor Vose,

suasit, misso *cataplasmate*, tumorem linamento et strupis, uti in altero exemplo, leviter comprimi: quod primo nihil valuit, scilicet non idonea cura aut peritia peractum. Aliquandiu igitur tumor accrevit, serpsit, et per integumenta late patuit, crustatus et aspectu foedus: Paulo diutius ita se habuit, cum tandem rite compressus decrescere coepit: multum humoris effluxit; crustae exiguae subinde evolutae sunt, et margo sanescere incepit. Tumor nunc celeriter subsedit, usque ad durae matris sedem, cute sanata. Puer inter curandum paulatim viguit; cibos rite appetere coepit. Tandem valetudinis integer et vegetus valetudinarium reliquit. Non nisi semel inter comprimendum distentionibus exceptus; quas vero Doctor Vose alvo tardiore et inde irritato genere nervoso ortas esse suspicatur; quippe quae cito alvo purgandae cessere, neque recidere.



---

---

### CAPUT TERTIUM.

Exempla et sententiae Abernethy ad Herniam aut Fungum Cerebri pertinentia, grandis sunt momenti quippe, quae naturam illustrant unius classis eorum tumorum, quibus hae voces plerumque appositae sunt. Sibi vero jure adsciscunt haud levem animi intentionem, si quidem Abernethy (qui literarum medicarum doctissimus apud omnes existimatur) inductus est, ut inde statueret omnes cerebri tumores, quorum meminerunt *chirurgi*, ad eandem classem, et easdem causas esse referendos, ad quas suus pertinet. Hac tamen quaestione jam nunc omissa, considerandum erit exempla et sententias Abernethy, eo consilio, ut magis hanc rem difficilem et implicitam expediamus; et potissimum insistendum est iis phoenomenis in istis exemplis prodeuntibus, quae proprie ad tales tumores pertinere haberi possunt: quibus eo magis insistendum, quo plus lucis af-

ferre possint, ad discernendum invicem malum, cujus propria sunt, et tumores cerebri cujusvis alius generis, quos observare nobis aut posteris felicioribus contingat.

Concesso igitur tria exempla, tumores, quales Abernethy descripsit, haud raro post calvariae partem sublatam oriri posse, satis clare edocere; constat eosdem semper e vasis cerebri plaga laesis initio proficisci; hanc vero noxam, ut tunicae vasorum debilitentur, recta efficere; et multum sanguinis, si hae dirumpantur, profundi. Haec profusio certe cerebro plus minusve nocebit, prout hoc ita se habeat, ut plus minusve laedi possit; prout citius aut tardius sanguis effundatur, et plus minusve certo tempore fluat; denique prout huic aut illi cerebri parti cruor incumbat. Qui vero morbo, qualem Abernethy narravit, laborat, necesse est primae ex his noxis eique gravissimae subjiciatur: cerebrum enim ictu terebram adhibitam praegresso laesum et infirmatum, ad inflammationem maxime erit proclive, quae cerebrum admodum irritabile reddit. Nihil vero omnino ad morbi eventum malum aut

felicem tantum operae confert, quantum sanguis plus aut minus alte in cerebrum effusus. Si enim sedem profundiores habeat, nervorum resolutio, et alia infelicia hujusmodi malorum propria, vix aut ne vix, extruso cerebro, levare poterunt; etiamsi multum calvariae deesset. In tali exemplo totum cerebrum ubique aequaliter opprimeretur, et inde pessima sequerentur necesse est. Ubi vero, ut in exemplo Abernethy, non nisi vasa exteriora laesa, paulo infra membranas, sanguinem effuderant, partes interiores, (quae, ut sanae sint, multo majoris refert), si dura mater mature tollatur, parum opprimantur: tanta enim, renixu levi, proclivitas est ad prominendum, ut fere tantum partes sanguini profuso proximae laedendae sint. Si igitur his confiso, sententia Abernethy ducendis, statuere liceat tumorem salutem moliri, mala praecavendo, quae sanguine intus occluso certissime enascerentur, quo factum est, ut in his ipsis exemplis, mors tumorem ortum illico exceperit? Scilicet, ad quam potissimum causam fatum sit referendum? Abernethy nihil ad hoc expediendum



disseruit : ejus vero sententia de morbi natura utenti judicare liceat, aut inflammationem, quae ipsa ad vim cerebri vitalem extinguendam valuit, profusionem sanguinis comitam esse, aut mortem provenisse e cerebro hac laeso, antea quam tensio et vasa absorbentia duram matrem summovent. Cerebro graviter noceri in omni istiusmodi exemplo, ubi dura mater non ipso initio sublata est, verisimile videtur ; eidem vero vehementer nocitum esse, in exemplis primo et secundo, testantur delirium et stupor ingravescens, quae antea accesserunt, quam tumores prodierant. Nisi igitur sanguinis profusio cerebro prius graviter nocuerit, quam dura mater hieverit, sperare licet, simul atque, dura matre remota, compressio sanguine orta cessaverit, signa jam dicta abitura, et stuporem paulatim excussum iri. Tanta malorum remissio, in tribus exemplis, alio aliud consequente, ne quidem medicum ingenii mediocris, multoque minus Abernethy virum summa mentis acie donatum latere potuit : quam quia silentio praeteriit, et memoravit singulos aegros in ejus exemplis biduo post

tumorem primo exortum, mortuos esse, nullam hanc omnino accidisse, et sanguinem profusum eo usque cerebrum ante laesisse, quam tumor inceperat, ut necem moliatur, judico.

Si, quae jam disserui, vero consentanea sint; id quod multa alia clare edocent, rigores et dolor gravior capitis, quae febrem sanguinis fluxum praegressam denunciant; delirium ferox inflammationis proprium, quod pari ratione profusio sequitur; aut stupor qui cerebro oppresso nasci solet, fortasse sanguine tardius e vasis ruptis effluente ortum; haec, aut aliqua ex iis, dura matre nondum exulcerata, neque exorto tumore, accidentia, satis lucide demonstrant cujusmodi sit malum.

Ex his signis plus minusve urgentibus, et indiciis malis, tumore tandem exorto, aut quiescentibus aut ingravescentibus, satis accurate, qualem morbus eventum sit habiturus, praesagire licebit. Exemplis igitur, quae protulit Abernethy, perpensis, statuo, quantum laesa fuerint cerebrum et ejus vasa, quanta sanguinis profusio extiterit, cognosci posse, tempore quo

primo tumor assurrexit post signa profusionis prodeuntia, ejus incrementi lege et ratione; et mutationibus singulis, quas subit ejus facies, rite observatis.

In plerisque exemplis judicare licet, tumorem serius ortum, rebus ita, ut mox protulimus, se habentibus, eundem cito ampliatur, et faciem subito mutatum docere, sanguinem celerius in cerebrum profundi, ideoque multum ejus inflammationis et incitationis, quae interna sanguinis profluvia comitantur, subesse. Primum exemplum Abernethy, de quo nihil fere commentatur, rationem signorum, quae fere huic morbo graviori contingere oportet, luculenter explicuit: puero scilicet annos quatuordecim nato (qua aetate arteriae pleniores maxime inflammationi favent) ictu calvaria fracta et depressa terebram accepit, et multum sanguinis coacti intus inclusi remotum est; vasa cerebri primo noxa illata, et dein sanguine sub calvaria concreto opprimente laesa, sanguine turgere coeperunt, et ipsum in inflammationem celeriter incidit. Hanc ineuntem sedarunt exinanitiones

multae et largae ; tandem vero, forsan hac salutari curatione intermissa, inflammatio viguit ; rigores et capitis dolores, die quinto decimo, supervenere, vulnere et dura matre faciem malignam prae se ferentibus. Quo ipso tempore verisimile est, quod sententiae Abernethy de morbi natura convenit, vasis quibusdam cerebri diruptis, sanguinem in ejus partem *medullarem* profluxisse : cerebrum inde levatum prope hiatus in calvaria terebra factum, cito, ut dura mater absorbeatur, effecit : die sexto decimo tumor apparuit, primo ipsi cerebro pia matre oblecto simillimus ; elapsis vero horis viginti quatuor, magnitudine malum aureum aequavit ; nigricavit, inaequalis et asper, pia matre non percipienda. Puer obiit die octavo decimo postquam primo aegrotaverat ; tertio vero post enatum tumorem. Haec signa novissima sanguine intra tumorem aut ad ejus radicem tandem profuso, et tumore exinde eo usque ampliato, ut margo asper calvariae terebratae cerebrum et piam matrem fere strangularet, plane exorta sunt. Reditus sanguinis a venis piae matris

difficilis, et ingressus per arterias prorsus impeditus, rationem lucidam faciei tumoris mutatae reddunt.

E supra memoratis patet artem medicorum frustra huic tumori serius post inflammationem accidenti obniti (id quod probe docet quanta sit ad morbum proclivitas) ejus malignam indolem hinc clarissime insigniri, et finem lethalem celeri tumoris incremento et subitis, quibus subijcitur, mutationibus, certissime praesagiri.

Quia prae auctorum incuria, nihil certi aut lucidi de hujus morbi gravis eventu praesagiendo invenire potui, iis, quae exempla Abernethy praebent, innixus, hanc rei propositae partem expedire, et pro viribus illustrare, conatus sum.

Abernethy, mirabile dictu! de signis ad corporis valetudinem pertinentibus, quae duos istos dies, quibus ineunti tumori supervixere, miseros invaserunt, omnino tacuit; nullis enarratis, nisi quae ad ipsius tumoris progressum et singulas ejus mutationes spectarunt. Neque vero memoravit, necne, mali natura manifesta, aliquid auxilii adhibuerit. Quae tanti momenti

omissa esse maxime lugemus; non nisi enim indiciis fideliter depictis, aut qualis sit morbus, aut quoties accedere soleat, frequenter an raro, aut quomodo optime debelletur, cognoscere licet. Nonnihil certe utilis et gravis didicissemus, si fusius ista auxilia scriptis mandasset, quae vel ad levandum vel sanandum hunc morbum, apud exempla, de quibus disserui, admo- verit. Saepius vero accidit, ut quasi fato quo- dam protervo et infelici, auctores celeberrimi unicam medicinae partem amplexi, quam summo amore et studio excolere consuerunt, eam caeteris parvi habitis anteponant, perinde quasi illa sola, his minime innixa, steterit; cujus rei ecce luculentum exemplum! Ardens desiderio naturae tumoris illustrandae, quem insolitum semel iterumque se valde miratum esse confite- tur, de signis *generalibus* nihili habitis om- nino Abernethy conticuit; imo etiam de me- dendi ratione disputans siluit prorsus, auxilia inflammationi isti, certeve eo propensione, se- dandae idonea, quae semper sanguinis e vasis ruptis profluvio adest, et ad ejusdem reditum,

plurimum operae confert. E proprio ipsius auctoris sermone constat, mali quasi radicem et summam, *Haemorrhagiam Cerebri* existere; tumorem vero, quem, calvaria remota, haec progignere possit, quasi adventitium esse, neque morbi partem necessariam, aut semel inter centum exempla contingere; neque omnino scrutatu aut notatu dignum, inter medendi rationem agitandam. Neque vero inficiandum, tumorem, eo quod, ut cerebrum effuso sanguine minus prematur, effecit, et aliis auxiliantibus, quodammodo saltem, quatenus et quomodo cerebrum laesum est, ostendit, aliquid studii mereri. Nihilo tamen majore observatione, his exceptis, dignus est, quam integumenta pus, serum aut quodvis viscus, alicubi corporis, velantia.

Morbus igitur, quem Abernethy testatus est, plane, imo lucidissime curationem *apoplexiae* sanguine intus effuso enatae idoneam desiderat. Patent medendi consilia; et quanto infeliciorum eventum habuit ea medendi ratio, qua hic medicus usus est, tanto acrius nitendum, ut, auxiliis praesentissimis admotis, quam celer-

rime profusio sanguinis intus quiescat, et cerebrum jam effuso expediatur. Ad PRIMUM CONSILIUM exequendum, oportebit sanguinem e brachio et capite elicere; alvum acriter purgare et *regimine antiphlogistico* uti. Quod ad SECUNDUM, vel tumore excidendo, vel sanguine ocluso ope ferramenti educendo explebitur. Nescio an metus profluvii sanguinis vitae gravis secuturi, medicinae *chirurgicae* peritum a tumore incidendo detineat, quando moles adaugescens acerrimum internum profluvium indicaret: minime tamen celandum, habitum vasorum disruptorum, et sanguinem effusum praesentem admodum arterias vicinas incitare; eoque conjicio hunc sublatum istam incitationem non posse non magnopere sedare. Quinetiam curatio, qua usi sunt plerique magni nominis nostrates et Galli, satis edocuit fluxum sanguinis ampliolem aut aegre compescendum, prae parte sana cerebri, et superficiei vicina excisa, nequaquam esse metuendum\*. Hinc haud veri ab-

---

\* Hill, Quesney, &c.



simile videtur tumorem non solum excidere aut ad sanguinem tollendum incidere licere, verum etiam, parum valentibus his rationibus, cavi parietes abradere.

---

#### CAPUT QUARTUM.

Nunc tandem absoluto sermone de proprietatibus insignioribus mali, quod Abernethy exempla produunt, et inde ducendis de medendi ratione talibus tumoribus apta, proximum est ut animum adverterem ad quaedam momentosa, quae ille vir eximius observavit, in opere antea citato, capite cui titulus "Cases of Fungus or Hernia Cerebri," et quae huic disputationi praeposui;

Propositis binis contineri possunt:

*Primum* est, quanquam tumores varii generis e pia matre et cerebro oriri possunt, hos tamen nondum discretos esse.

*Secundum*, morbum, qui describi solet sub nomine Hernia Cerebri e tumore coacto sanguine effecto componi, uti qualem Abernethy notavit.

Res est perquam admiranda, tumores quos hujus disputationis argumento selegi, fere semper sine ullo discrimine Hernias aut Fungos Cerebri nominatos esse; quae voces, quamvis altera longe aliud atque altera denunciet, et ea ratione semper adhibeantur, quando de quovis alio simili malo disputatur, hic tamen unum et idem per scripta medicorum indicant. Non minimi intersit requirere, unde confusio adeo insignis provenerit. Aliquid obscuri et dubii sane exortum esse potest, ex his tumoribus aliam atque aliam speciem proferentibus interpretandum. Sed quantumcunque difficile sit rationem reddere talis vocum confusionis, fatendum est, medicis, qui proprie animos ad hanc rem applicuerunt, persuasum fuisse omnigenum tumorem calvariam et duram matrem divulsassecutum, novam esse naturam, actione morbida vasorum cerebri enatam. Documentum hujus

rei clarius vix exquiri potest, quam quae Abernethy a suo exemplo secundo deduxit; asserit enim (ad suam sententiam firmandam, morbum a plerisque Hernia Cerebri vocatum, e tumore coacto sanguine facto componi), *fungum organicum* non fieri posse tantulo tempore, quantulo hi tumores perfici solent\*. His perlectis, haud dubitari potest, quin Abernethy eruditus ille et acri ingenio praeditus, semper Herniam cerebri aestimaverit morbum ejus visceris acutiorem, et natura fungo similem. Verisimile est hunc errorem, in quem omnes fere *chirurgi* incidunt, evitatum fuisse, si caute considerassent mutationes graves cerebri et ejus vasorum actionis, quae semper necesse est e parte cerebri et durae matris divulsa oriantur: Si animum huc advertissent, inde vix non percepissent quantum ortus tumoris, qui optimo jure nominari potest Hernia Cerebri, sed qui natura penitus fungis a plerisque descriptis dissimilis

---

\* Vide Surgical and Physiological Essays. Part III. p. 40. vel Appendicem huic opusculo subjectum.

est, impelleretur, imo prorsus inniteretur partibus cerebri cingentibus remotis. Hoc, quod a priori quivis facile statueret, re ipsa observata, clarissime patet: hac enim sola sententia usi lucidam rationem reddere possumus exemplorum, quae in scriptis invenienda sunt, cerebri tumorum omni malo ejus acuto vacantium.

Quaquam hi tumores nondum proprie discreti aut cogniti sunt, secundum Abernethy\*, neque omnino inter scribendum vel curandum disjuncti sunt e tumoribus Abernethy, et morbo isto maligno, qui a Carolo Bell, qui solus eundem notavit, fungus cerebri nominatur: nullus tamen dubito, quin clarissime docere possem tales discriminationes plane grandis momenti, quod ad singulorum generum naturam, causas et curationem, recte institui, et maximum medicorum studium mereri. Duo exempla Doctoris Vose, ante prolata, et infra † longiore sermone narranda, hujusmodi sunt, nempe cerebri ipsius protrusi exempla: et pleraque sine dubio eodem

---

\* Vide "Motto."

† Vide Appendicem.

releganda in scriptis medicorum traduntur, e quibus aliqua proprio loco citanda erunt.

Nunc tamen ceteris omissis, non nisi exempla, quae mecum communicavit Doctor Vose, agitandum erit. Quorum historiae summa accurate conscribuntur et singula magni momenti, ad mali progressum pertinentia, complectuntur; haec sane perinsignia hujus tumoris sunt exempla, quae clare docent, hos tumores a primo ortu usque ad finem, natura longe alienos esse ex una parte a *tumore ex Haemorrhagia Cerebri*, quem Abernethy, ex altera etiam, a Fungo Cerebri, quem Carolus Bell protulerunt. Rem ita se habere, et plurimi interesse invicem discernere, in scribendo et curando, morbum Doctoris Vose, Abernethy, et Caroli Bell, hos, alium alii, inter se conferendo, optime liquebit.

Imprimis, inter se conferendum mala a Doctore Vose et Abernethy descripta.

I. Jam\* antea memoravimus tres istos tu-

---

\* Vide Caput Secundum aut Appendicem.

mores, quos Abernethy retulit, die xv, x, et xii post terebrae usum primo extitisse; ea vero signa, quae inflammationem adesse, et effusum inde sanguinem in cerebro denunciant, antecessisse; porro, exulcerationem durae matris et ejus hiatus, quo tumor ascendit, sanguine subiecto premente facta esse: contra autem, in binis istis exemplis mali, apud Valetudinarium Guidianum Londinense et Liverpool, duram matrem utrique aegrotanti, una cum cingente calvaria, biduo vel triduo prius sublatam esse, aut incisam aut dilaceratam, quam, renixu ita sublato, pars tumuerit: neque comperire potui ulla mala aut graviora signa tumoribus evolutis accessisse: et Doctor Vose me certiore fecit, si accessissent, eadem latere non potuisse.

II. Tumores Abernethiani, uno die postquam nati sunt, mole ovum gallinaceum aequaverant; nigri, inaequales, et granati, scilicet propter sanguinem manantem et coeuntem, quo maxime constiterunt. Aegri singuli, quos Abernethy curavit, tertio die ex tumore prodeunte

mortui sunt. Tumores vero, quos hisce opponere visum est, ab ipso initio, cerebri ipsius sani paululo *fibrinae* humectati speciem prae se tulerunt. Tumor ille, quem apud Valetudinarium Liverpool curatum notavi, non nisi pluribus hebdomadis exactis, summam expleverat magnitudinem, ejus facie vix mutata; etiamsi nulla validiora auxilia, nisi multo post eum exortum, ad repellendum tentata fuerant: neque non pariter felicia fuere signa ad corporis valetudinem pertinentia.

III. Abernethy, signis inflammationis et sanguinis profusione fretus, quae suis morbi exemplis evenerunt, tumorem omnino premen- dum strenue negat; ne scilicet hunc repressum sanguinis in cerebrum fluxus et ipsa *apoplexia* sequerentur. Quod plane demonstrat quantum inter hunc affectum, et quem indicant exempla Londini et Liverpool curata, intersit; quibus pressura clare optimo, forsitan (uti infra docebi- mus,) unico remedio existit: neque fere ullum aliud, nisi hoc perite et aequaliter adhibitum, mi- nistratum est. Hoc vero eventu felici fretus

talem curationem idoneam, et in similibus exemplis profuturam arguit. Neminem certe latere potest discrimen tantum et adeo manifestum; nimirum, unicum remedium huic malo sanando accommodatum, illic nervorum resolutionem, imo fatum ipsum arcessere.

Denique, eventui lethali istorum trium exemplorum, qualia nullus auctor praeterea, quod scio, scriptis mandavit, haec duo objicio in sanitatem abeuntia, quibus pleraque similia, id quod mox ostendam, in scriptis de medicina *chirurgica* eduntur.

Inter Fungum Cerebri Caroli Bell ab eodem protruso discernendum, qualem morbum exempla Doctoris Vose praedicant, sufficeret forsitan opponere tumorem maligni habitus, maxima totius corporis turba stipatum, cerebro ipsi sano e propria sede extruso, valetudine penitus illaesa.

Non verò alienum erit paulo amplius hanc rem tractare, ad melius et clarius distinguendum.

Fungus Caroli Bell (quod patet ex descrip-



tione quam edidit \*, nulla enim praebeuit exempla) calvariam carie malo Veneris profecta resolutam, vel perterebratam excipere consuevit; ubi cerebri pulsus, dura matre aspero margini foraminis terebra effecti illidenda, ut eadem exulceretur, fecit. Malum vero ei, cujus exempla Doctor Vose dedit, simile fere semper juniores adoritur, antea valetudinis integros, quibus dura mater aut arte puncta, aut aliquo casu dilacerata fuerat.

Bell videtur exulcerationem Cerebri Fungi ortum comitari; et profecto res ita se habuit in suis exemplis. Nulla vero exulcerationis indicia, aut exempla Doctoris Vose, aut quae alii scriptores memorarunt, exhibuere: nihil morbosum nisi ad superficiem apparuit. Nequeo equidem affirmare e corporibus incidentis compertum esse, cavum exulceratum haud cerebro infuisse, ubi cerebri ipsius pars extruditur; sed quia fatum cito necesse est consequatur talem exulcerationem, non dubitabo asse-

---

\* Operative Surgery, Vol. I.

rere eandem defuisse. Quinetiam, exulcerationem semper tarde effectam inflammatio praegreditur; quae vix fieri potest ut subesset, nullis omnino malis indiciis praesentibus.

Concedendo interdum in suo morbo cerebrum ipsum primo tumescere, Bell fatetur Fungum sua specie a cerebro ipso diversum esse; et ne me fallat memoria, exemplar arte praeparatum hujus tumoris, quod saepius Caroli Belli alumnus, contemplari solitus sum, nequaquam cerebri meri notas exhibuit: tumores vero Doctoris Vose, omni ex parte, cerebrum sanum retulerunt, pure madefactum, et hic illic *fibrina* aspersum. Conferendo horum propria, levia et felicia signa ei dirae catervae malorum, quae ad Fungum pertinet, non possumus non judicare, in hoc cerebri fabricam graviter intus antea laesam fuisse, quam aliqua mali testimonia extrinsecus prodierant; illos ictu vel casu aliquo recenti cerebro sano illato ortos, prorsus alienos esse, ab hoc insidiante et tardo, cui cerebri laesa compages accedit: haec duo mala nulla similitudine convenire inter se, nisi quod utrumque

eandem partem male habet, et utrique favetur, dura matre et calvaria variis casibus remotis.

Denique, quod maximi est momenti ad hanc quaestionem expediendam, ex altera parte, Bell affirmat, “ a degree of compression “ equal to that of a considerable artery will “ not subdue it (viz. Fungum Cerebri propri- “ um) when its growth has got head:” ex altera autem, pressura levis, suadente Domino A. Cooper, unum ex his tumoribus repressit, et ad calvariae perterebratae hiatum sidere coegit; alterum vero \* similis curatio similiter affecit, etiamsi paulatim plures hebdomadas increverat, et ad summam magnitudinem pervenerat, priusquam idem auxilium admoveretur.

Confido me tandem lectori ingenuo monstrasse, jam dicta vera esse et adeo momentosa, ut ignoscatur, quod auctoribus dissenserim, et praesertim sententiae temere acceptae, quam Abernethy amplexus est, nempe omnes cerebri

---

\* Apud Liverpool.

tumores *suum* referre; et varia eorundem genera statuere et invicem discernere conatus sim.

His fiducia summa freto mihi vix non licebit rejicere nomina absurda, quibus tumor fere quisque cerebri hucusque confuse designatus est; et, quo magis perspicue et ordinate disse-ratur, eam vocem *Herniam* Cerebri solum adhibere isti tumori, qui procul dubio ipsius cerebri parte protrusa componitur.

Nunc sequitur ut *Herniae* Cerebri naturam et rationem prosequeretur, morbi in quo agitando, multum lucis elicatum iri sperare licet, utilissimae ad hoc multiplex et obscurum argumentum explicandum et illustrandum. Causae, quas exempla edita docent esse proclivitatis eo gener-trices, videntur esse pars calvariae et durae matris divulsa; infantia et corporis plenitudo: quas singulas tractandum.

Maxime omnium valet prima ex his causis; plerumque enim asserere licet *Herniam* Cerebri non posse fieri, integris et illaesis partibus cingentibus. Quandocunque igitur pars calvariae deest, sive id ab initio natura, sive ars, aut

plaga fecerit, cerebrum non solum huic malo opportunum existit, verum etiam, quodam impellente nixu, ipsum eo tendere videtur. Observatu dignissimum est huc adeo idem interdum esse propensum, ut, integra dura matre, cerebrum tamen a sede solita assurgeret. Morbum cerebri proprium, cui patent infantes tenerrimi jam nati, quidam scriptores solum *Herniam Cerebri* alii *Encephalocelen* vocarunt: hic sive ossea parte calvariae deficiente, sive ipsa inter parietum laesa, cerebrum protruditur, tumore *pulsatili* facto solitis tegumentis obducto, et interdum insignis magnitudinis. Hujus vitii minime, ut credo, rari, neque saepe lethalis, Le Dran exemplum scriptis mandavit\*; neque pauca ejusdem generis testari praeclaro hujus Academiae professori † contigit. Necne in hoc malo dura mater dilaceretur, nondum, ni fallor, pro comperto habetur; eandem vero integram esse verisimilius est, propter crassitudinem ejus apud infantes, et omnes partes calvariae adeo mobi-

---

\* Vide Observations de Chirurgie, Tome premier.

† Monro tertio.

les et flexiles, et magnam vim resiliendi ad cerebrum hac aetate pertinentem ; quae simul probe docent, quare toties hoc malum infantes adoriatur.

Quantum pars calvariae divulsa vi aut arte, adhuc integra dura matre, ad Herniam Cerebrigiendam conferat, ex iis quae Gallici \* scriptores tradiderunt, disci potest : qui meminerunt nervorum distentiones et soporem supervenisse, quando, terebra prius admota, aliquantum tumoris cerebri dura matre obtecti videretur constituere “ une espece de hernie c.” Non invenire potui prorsus eadem in scriptis nostratum enarrata. Cum vero tumor ejusmodi certe aliquando saltem evenerit, eundem saepius accidere posse, imo etiam accidisse, verisimile est ; et eodem semper referendus erit, scilicet ad statum cerebri mutatum, ex tutamine et pressu solitis remotis.

Constat tamen hujusmodi tumorem minoris

---

\* Memoires de l'Academie Royale de Chirurgie.  
Tome I.

esse aestimandum, neque nisi nomine isto levi, quod imposuerunt, qui eum observarunt, esse dignum: dura mater integra, etiamsi calvaria subtraheretur, valide et efficaciter reniti solet, et ita praecavere, quo minus *intumescencia* eo usque increseat, ut metum faciat; et aetate florente vel adulta profecto, eadem membrana nunquam eo prolatari potest, ut inde periculum instaret. Hoc enim differt a ceteris membranis quae serum halant, quod ipsa calvariae tutelae vel *periosteo* existit, arcte eidem adhaerescens, nullubi omnino mobilis aut mota, integra corporis valetudine. Error iste, quo olim de hac re medici hallucinati sunt, jam diu obsolevit. Si vero contemplerim vim insignem, qua pollet calvariae et simul ipsius membranae pars direpta, herniae cerebri inferendae, tum profecto partem utilissimam et gravissimam hujus mali historiae prosequimur. In quoque fere Herniae Cerebri exemplo, dura mater ictu aut arte prius dilacerata est<sup>d</sup>.

- His igitur incitatus, ut causas inquirerem rei perinsignis in hujus mali descriptione, animum

adverto ad fabricam considerandam partium, quarum functiones afficiunt *operationes* Herniam Cerebri praegressae.

Prima et praecipua res consideranda est mirabile illud artificium, quo natura praecavit, ne noceat subitus et abnormis impetus cerebro illatus. Sanguis ascendens cursu contrario atque eo, quo omnia suo nutu tendunt; iter anfractuosum et multiplex, et cursus et propria distributio arteriarum antequam cerebrum penitus inierint; denique cerebrum ipsum in *lobos* diductum; haec omnes cerebri proprietates, certe non minus cavent, ne sanguis subito, inaequaliter aut justo validius, intus moveatur, quam calvaria et membranae cingentes noxas praeveniunt externas. Quinetiam, fabrica et situs proprius venarum majorum cerebri, quas leviter premunt singulae arteriarum dilatationes, faciunt ut sanguis multo celerius ad cor dextrum rediret<sup>e</sup>. Haec omnia vero, quantumcunque malum praecaveant, eorum auxilio multum repugnabitur, si pars calvariae dimoveatur; si tamen dura mater etiam divelleretur, nil omnino proficiet. Adminiculo



enim, quod inde datur, alicubi sublato, compressio inaequalis fit, et ad partem cerebri nudam, quasi ad centrum, feruntur omnes ejus humores. His omnibus ita se habentibus, et tumori, quem prosequor, faventibus, manifestum est, rationem motus sanguinis eventum plurimum recturam esse, potissimum in ea cerebri parte, quae calvariae hiatus subjicitur. Fere in omni exemplo alicubi corporis, observatur compressionem vasis alicujus partis ereptam, tar- do humoris intus fluentis motu, et ipsorum plenitudine excipi. Quae si vera sint, neque aliqua sit causa, quare vasa cerebri etiam non eadem legi obsequantur, non difficile est intellectu, quanta foret ejus vasorum plenitudo, si in animo habeamus, quanto tenuiores his tunicae contingant, quam aliis alicubi, corporis; *tunica* nimirum *cellularis* deest, aliis fortissimo tutamini. Neque parvi refert meminisse, venas pro rata parte, magis adhuc quam arterias, impletum iri; illis enim non fibris motricibus donatis, et quam his tunicas debilioribus, multo minor subest sanguinis moli et impetui renitendi facultas. Quin-

etiam, venae per cerebri superficiem sparsae creberrimae et amplissimae sunt; ideoque necesse est ut plurimum turgeant, adminiculo solito orbae, quod calvaria et membranae obducentes largiuntur: et nixus, quem necesse est hae tumentes edant, aliaeque supra dictae causae, quae omnes ibi potissimum agunt, ubi renixus est minimus, (scilicet apud hiatum, quem terebra effecerat) me iudice, ad cerebrum hic loci projicendum valebunt, et proprium tumorem nunc describendum et illustrandum gignent. Mihi liquet hanc mali rationem simplicem esse, naturae convenientem, et rebus ipsis exponendis idoneam. Nulla inepta *hypothesi* nititur, et facile intelligitur, imo eandem clare suggerit *a priori* cerebri fabrica cognita et perpensa; et certe *anatomie* soli duci fidendum, in rebus ad *pathologiam* pertinentibus inquirendis.

Quum tandem docuerimus, quousque pars calvariae et durae matris dimota Herniam Cerebri parere valeat; in animo habito, eo non parum operae conferre vasorum statum, scilicet compressione et tutamine solitis orborum; non

alienum videtur anquirere, quae causae ipsi corpori propriae, neque omnino extrinsecae, huic morbo favere possint. Docent exempla Doctoris Vose et alia similia, (quae hic illic sparsa per libros medicorum hic solum citare possum<sup>f</sup>) tumorem Herniae Cerebri, hoc praesertim insignitum, quod ex omni parte ipsum cerebrum refert, fere semper impuberibus et adolescentibus contigisse. Tanta apud infantes est proclivitas ad ascensum tumoris, quem prosequor, ut metuendum sit ne cerebrum prominere, etiam calvaria sola deficiente. “ I never, in “ boys,” ait celeberrimus Johannes Bell, “ find “ the dura mater capable of supporting itself; “ whenever the openings are wide, it inflames, “ sloughs, gives way at one or more points, “ and the proper substance of the brain, *previ-* “ *ously suppurated, and ready to form a fungus,* “ protrudes<sup>g</sup>.” Quae cum ita essent, sequitur ut istas harum aetatum proprietates quaererem et notarem, quae hujus tumoris ortum adjuvare videantur. Has vero potissimum contineri judico ratione motus sanguinis et vasorum statu

infantiae propriis ; partium solidarum tum continuo increscentium dilatatione et nixu, et quibusdam rebus infra narrandis, quae fere semper prius eveniunt, quam calvaria arte perterebretur ; id quod fieri solet, post caput ictu graviter laesum. Quinetiam, praeter motum sanguinis velociorem et incitatioem, infantia et juvenili aetate quam proveciore, celerius incrementum quarundam quam aliarum partium postulat, ut earundem arteriae eo magis ista polleat actione, unde singulae partes corporis cum solidae, tum etiam fluidae ducuntur. Inter tales partes, certe praepollet cerebrum, sensus omnigeni meta, et voluntatis sedes ; quae mentis facultates primae omnium post inceptum spiritum exercentur : ideoque opus fuit ut cerebrum primum omnium his gravibus suis muneribus rite fungendis accommodetur. Neque inficias eundem, quin amplitudo vasorum cerebri, et cursus et impetus iste proprius sanguinis insigniter huic magno visceri mature evolvendo aptentur. Prima igitur aetate, quando arteriae totius corporis, at cerebri praesertim, pleniores sunt, quod molle, delicatum

nunc parum renititur, vix fieri potest quin sanguis ad partem calvaria et dura matre privatam fortiter impelleretur, et ideo cerebrum cito extruderetur<sup>h</sup>. Constat enim hanc incitatum vasorum actionem, ubicunque evenit, validissime omnium affecturam esse partem minime omnium renitendi potentem, scilicet, quae hiatui per tenebram facto subjicitur. Cerebri ipsius status post istas noxas illatas, quae terebrae usum antecesserunt et postulare existimatae sunt, multum huic malo auxiliabitur. Prae injuria, quam patitur cerebri pars ei calvariae ictae subjecta, inducor ut crederem aliquantum inflammationis concitari, hanc vero potissimum parti extrusae accidere, scilicet injuriae accipiendae opportunissimae, imo forsitan esse tumoris causam haud contemnendam. Hernia jam nunc facta, statuere licet, propter mutatam sedem praeter naturam partis cerebri protrusae; propter scabrum calvariae vulneratae marginem, quo tumor circumdatur et premitur; denique, propter alias bene multas noxas irritantes, quibus tumor continuo obnoxius est, aliquid inflammationis antea

excitatae, potius auctum quam sedatum iri. Asserere licet, etiamsi nulla inflammatio prius extitisset, has causas, tumore jam evoluto, agentes eandem accendere posse. E priori ex Vosianis mali exemplis, apparet arterias aliquamdiu concitatas hanc inflammationem praedicasse; et certe non rationi repugnat conjicere eandem plerumque adesse (quod non minimi aestimandum est in *hypothesi*). Porro, tumor Herniae Cerebri, initio, paucis diebus, multo celerius increvit, quam ullo tempore postea; initio etiam, ceteris paribus, inflammatio incitator est quam postea; et quo magis haec sedetur idoneis exinanitionibus admotis, eo tardius tumor adaugescit; et simul atque inflammatio penitus fugata esse videtur, tumor fere subsistit. Hujusmodi fuit mali progressus in exemplis Doctoris Vose, antequam compressio illata eundem mutaverat: quocirca vix aut ne vix dubitandum est, inflammationem frequenter Herniae Cerebri accedere. Quomodo inflammatio aut parti aut toti cerebro incumbens, ad hunc morbum inferendum operam confert, in aprico est: inflammationis ea ratione, quae

signis ipsis omnino consentanea apparet, docemur, vasa partis inflammatae ampliari; ea vero quae huic proxima sunt, vel eam circumdant, motu solito vehementiore agitari. Licet igitur affirmare vasa sanguinea tumentis partis in Hernia Cerebri praeter consuetudinem dilatari, et vicina ultra modum concitari; amplificationem vasorum cerebri inflammatione ortam perinsignem esse, partim prae molli et tenera cerebri fabrica, cui insident, et ideo unde parum fulciuntur; partim vero et potissimum, prae tenuitate et imbecillitate tunicarum, ista simul *cellulari* deficiente. Haec proprietates igitur motus sanguinis et actionis vasorum efficere videntur, ut pars cerebri antea nuda eo facilius et citius protrudatur. Contemplantibus igitur causas jam nunc memoratas, tutelam consuetam sublatam, quam naturae almo consilio praebent calvaria et dura mater, et causas ad corpus ipsum attinentes, nempe infantiam et plenitudinem, nil dubii erit, quin causae effectibus gignendis sint penitus habiles.

Quae supra disserui de vasorum conditione apud Herniam Cerebri, clare edocent eandem recte curatam esse in exemplis quae Doctor Vose mihi praebuit, aliisque eadem ratione feliciter curatis. Haec curatio, nimirum compressio admota, fungendo vice calvariae et durae matris deficientium, vasa debilia cerebri fulcit, et eo collabi sinit, ut, linea media naturali facta, cavo calvariae rite aptentur; dum tumor, ut in exemplis Doctoris Vose, sensim extenuatur, tandem intra calvariam lapsurus. Ille vir eximius Astley Cooper, quo suadente, tumor primo apud Valetudinarium Guidianum compressus fuit, et postea eandem accepit curationem in Valetudinario Liverpool, non omnino invicem discernit cerebri varios tumores; sed inductus est curatione uti, adeo aliena ab opinione communi de hac re, eo quod observaverat cuncta alia remedia adhibita, ad cerebri tumoribus laborantes levandos, fatum intulisse. Ni tumor comprimatur, A. Cooper existimat cerebri partes emortuas ad hiatum durae matris separari, eoque ejus ventriculos patefieri: unde re-



solutio nervorum et mors. Idem evenire solet, si tumor excidatur quoties ascendit, pressura non admota, ad ejus reditum praecavendum<sup>1</sup>. Certior factus sum Warner, “Fungum vel Herniam Cerebri,” curasse hac ratione, et eodem malo exitu. Hill vero, qui solitus duram matrem inter perterebrandum secare, ita frequenter hunc morbum genuit, exsecuit tumorem feliciori eventu. Quoniam vero hoc fecisse plerumque est occidere; et quia haec curatio falsa opinione nititur) scilicet omnes cerebri tumores naturae esse malignae et spongiosae, longe fabricam a cerebro ipso alienos, neque aliquid cum hoc commune habere, nisi sedem adventitiam), oportet alteri cederet, hucusque plerumque felici; et quam idoneam arguit ipsa ei rationi Herniae Cerebri, quam exponere et illustrare conatus sum, omnino consentanea.

At vero objici potest, ex una parte, Abernethy monuisse, caveamus a comprimendo tumore *Haemorrhagia Cerebri* exorto; ex altera, hanc medendi rationem adhibitam uni ex exemplis morbi Hillianis, uni, quod retulit Scultetus, et

alii, in opere cui nomen “London Medical Journal,” enarrato, (quae omnia confitemur Herniae cerebri exempla existere), primo illi signa perniciosissima intulisse, binis alteris ipsam mortem. Prius ex his objiciendis certe ineptum est; eo quod confido me clarissime monstrasse, *tumorem ex Haemorrhagia Cerebri* natura fere contrarium esse Herniae Cerebri proprio: posterius tamen longe gravius est, et amplio-rem inquisitionem meretur. In exemplo, quod edidit Hill, parte calvariae, quae siderat, levata, sanguis profusus fuisse apparuit; et pus e membranis punctis effluxit. Haec vehementiam insignem ictus illati ostendunt: stupor aliquamdiu post terebram immissam perstans, et ima pars tumoris postea suppurans, clare cerebro indigniter nocitum fuisse indicant. Tumor qui assurrexit per hiatus calvariae perterebratae, non potuit esse pars cerebri sani extrusa: pus enim ejus faciem obduxit, et ab ejus radice provenit. Ideoque talem tumorem comprimere, cerebri partem jam antea laesam, imbecillam et exulceratam male haberet, pus includeret et co-

hiberet, et intus in cerebri sanas partes impelleret; eoque fere pariter laederet atque ictus, qui malum genuerat, iteratus. Quandocunque vero, quod saepius accidit, signa infelicia quae in Hilliano exemplo contigerunt, Herniae Cerebri desunt, tantula compressio tumori admota, quantula, ne amplius inerescat, impediret, vice calvariae et durae matris perfungendo, reditum partis extrusae adjuvabit; non simul tanta, ut, toto cerebro oppresso, solita mala inde orta accederent.

Ubicunque compressio progignit mala, qualia in exemplo Hilliano memorantur, ad easdem causas, me iudice, haec referri possunt. Hujusmodi sunt exempla novissime\* citata; quorum priori aeger, elapso mense, periit; alteri sex mensibus ex ictu recepto. Utriusque, cerebro patefacto cavum amplum inesse repertum est, humore implente factum; qui effugere non potuit, hiatu calvariae per tumorem, et pressuram adhibitam obturato.

---

\* Vide "Sculteti armamentarium chirurgicum, Ob. XIX." et "London Medical Journal, Vol. X. p. 277."

In hujusmodi exemplis, compressio sine dubio nocere potest, pus, quod ejici oportet, includendo et coërcendo. Hoc verò concesso, non tamen ideo compressio saepius minus utilis habenda; exulceratio enim adventitia est, neque aliqua necessitate huic tumori accedit. Quando pus deest, vel, si adsit, ubertim effluit ad latera tumoris, comprimere licet: in secundo exemplo Doctoris Vose, plurimum puris e lateribus tumoris profluxit, eo ipso tempore quo pressura admota maxime tumorem repelleret.

Quoniam judicare licet cerebrum *semper* accurate implere cavum calvariae, compressioni objici posse videretur, quod pars extrusa est aliena et extranea, ideoque omnes conatus editos ad extraneam naturam vi intus impellendam, necesse est eventum pessimum habeant. Nihilo secius tamen inducor ut hanc curationem his objiciendis praeponerem, etiam ratiocinationi soli *a priori* confisus, etiamsi experientia, documentum lucidissimum, non eandem tutam et utilem indicasset. Ni fallor enim, perhibere licet naturam prorsus alienam, fabricae mollis, et cerebro

similis sine ulla pernicie intra calvariam immitti posse, ea tarda et levi pressura facta, qualem linamenta et strupi emplastro resinoso illiti, imposita efficere solent; dummodo inflammatio praecaveri possit. Hujus rei scripta de medicina *chirurgica* documenta amplissima praebent\*. Praeterea, usus fere quotidianus ostendens salutem receptam ex *apoplexia*, et calvariam depressam vel *exostosi* tumentem, nullo fere incommodo consequente, clare demonstrat cerebrum, nisi inflammatio praesens idem facilius laesu et irritabilius redderet, impune pressuram sensim auctam subire, quasi consuefactum †. Hinc vix equidem haeremus statuere, etiamsi alia documenta deessent, partem ipsius cerebri, in cavum calvariae impune reduci posse; scilicet, cerebro toto non inde oppresso, et vix metuendas esse eam irritationem et inflammationem, quae proficiscantur e natura aliena non vasis cum cerebro commissa.

---

\* Vide "Memoires de L'Academie Royale de Chirurgie."

† Evolve opera Morgagni, Hill, Abernethy, et Joannis Bell.

Compressionem vero idoneam arguit non minus ratiocinatio e mali *phoenomenis* deducta, quam ipsa experientia. Omissa omni disputatione de mutata ratione actionis vasorum partis protrusae, nihil tamen dubitandum, quin malum e partibus, quae cerebrum fulciunt et sustinent, adeptis, proveniat. Hinc sequitur, auxilium simplex et naturae conveniens, illud esse quod, cerebrum sustinendo, idem amplius protrudi vetet, et, si fieri potest, faciat ut pars antea protrusa relabatur. Haec clare deducenda esse, pauci, ut credo, agnoscere nolent; neque minus manifestum est, consilium ita deductum optime linamento et strupis emplastro resinoso illitis, impositis esse exequendum: quae enim non solum juvant, ascensui tumoris repugnando, sed efficiendo ut magna pars tumoris sensim prius labefieret suppurans et separata, quam compressa intra marginem calvariae reducatur. Naturam suggerere tumoris compressionem docent etiam rationes, quibus ea sola utitur ad malum sanandum, in Hernia Cerebri. Quando, integumenta sanescentia tumorem operiunt,

aliquando hunc exiguum repellunt, ampliorem strangulant, eoque faciunt ut tumor suppuret, et carptim delabatur \*. Porro, in Hernia Cerebri infantium jam natorum ante dicta, integumenta renitentia incremento tumoris, et postea ossa calvariae penitus indurata interdum morbi sanationem perficiunt. In plerisque talibus exemplis, Trew et Le Dran hanc operam naturae juvarunt tumorem comprimendo, penicillis amplioribus alcohole madefactis et pileo imposito retentis; quae diu adhibere.

At vero requiri potest, quibus legibus compressio, quam praecepimus, regenda est? Hae plerumque deriventur statu cerebri, quod ad inflammationem attinet, et mole tumoris, prout minor aut amplior sit.

Ubi inflammatio acris ascensum tumoris comitatur, (id quod evenit in exemplo a Joanne Bell memorato), compressio vehemens tumoris nocitura esse videatur; si vero inflam-

---

\* Vide Exemplum hujusmodi apud Medical Commentaries, Vol. I. a Doctore M'Lagan traditum.

matio levior sit, quod pressurae objiciatur, minoris aestimandum est quam aliquis primo judicaret. In priore ex exemplis quae Doctor Vose praebuit, compressio tumoris nihil mali induxit, etiamsi signa munera cerebri insigniter turbari docuerunt, ea curatione primo admota: et sanè ineunte Hernia Cerebri, pressura videtur potius impedire ne plus cerebri extrudatur, quam totum cerebrum afficere. Porro, verisimile est, compressionem levem, vasa prolapsae partis fulciendo, efficere posse, ut vasa facilius coarctentur, et molem naturalem recipiant; eoque cursui inflammationis repugnare, non favere. Jam antea docuimus exulcerationem praesentem non, quo minus tumor arte comprimatur, vetare oportere, modo liber exitus puri concedatur.

Res ultima, quod hanc curationem temperari desiderat, est ratio tumoris magnitudinis, eo tempore quo curatio agitanda est et suscipienda. Ratiocinatio rebus ipsis deducta, qua ratione argumentum tractandi uti solemus, nos ducit ut statuamus, compressionem, qua opus



est ad Herniam Cerebri repellendam, pro mole tumoris, majorem aut leviolem, imponendam. Jam ineunte tumoris ascensu, quando verisimile est inflammationem maxime ardere, compressio levissima satis efficax esse videtur. Hey\* qui hallucinatus invicem confudit Herniam Cerebri sani simplicem et Fungum istum malignum adeo clare suis signis notatum, a compressione utenda abhorret; et opinatur se feliciter bis malum curasse, tumoribus non nisi linamento obtectis. Pari ratione Fabricius Hildanus malum, quod ab ipso Fungus vocatur, ad sanitatem perductum esse, existimat; vi medica quarundam plantarum; asserit autem se etiam emplastrum imposuisse. Vix dubitari potest, quin exilis ista compressio linamento exorta, in exemplis mali, quod curavit Hey, et emplastro facta, in eo, quod narravit Fabricius Hildanus, salutem reduxerit: consilium enim exequendum, ineunte Hernia Cerebri, pariter atque in exemplo a Marechal edito, jam citato, (vide

---

\* Vide "Practical observations in Surgery by William Hey, F. R. S, &c. 1810." P. 12 et 14.

Annotationem <sup>c</sup>) non tumorem intus in cavum calvariae repellere, sed solum cerebrum fulcire, eoque, ne tumor amplius emineret, impedire; donec cicatrices praegressae, tardius sed valido profectu, id moliantur, quod ars faceret in exemplis mali provectoris, in quibus, solummodo tumoris ortui reniti, non satis valet. Hernia Cerebri enim jam provectora et ad finem contendente, quando tumor amplior latius per integumenta dispergitur, opus esse videtur compressione valida et perite temperata uti. Compressio apud posterius e Vosianis exemplis tentata nil tumoris incremento restitit, donec aequaliter et fortiter admota fuerit.

Quod ad curationem ipsius tumoris, in Hernia cerebri, nulla auxilia, praeter supra enarrata, exquisita sunt, si excipias *Styptica*. Exemplum ab Hildano, et aliud ab Hill prolata, quibus haec eventu infelici imposita sunt, vetant, quo minus in omni casu admoveantur. Aqua salibus astringendo idoneis saturata manans per latera tumoris, petiisse videtur spatium inter cerebrum sanum et membranas. In duobus ex-

emplis, apud Valetudinaria Guidianum et Sancti Thomae Londinensia, tumores continuo linteis *aqua calcis* imbutis madefacti sunt. Hoc auxilium astringens efficere videbatur, ut compressio magis juvaret, et ad tumorem repellendum valeret.

Quoniam perhibuimus cerebrum plerisque Herniae Cerebri exemplis inflammari, manifestum est acerrime utendum esse remediis quae *regimen antiphlogisticum* constituunt: asserere licet mittere sanguinem, incisa vena, potissimum opus esse; quippe quo remedio vasa partis distenta depleri possint, et actio caeterorum vicinorum sedetur.

Infelicissima res omnium, quae evenire possint inter horum malorum cursum est irritatio, quibuscunque noxis orta, animae fistularum: tussis inde nata mirum in modum tumoris incrementum promovet, et signa inflammationis praesentis intendit. Exemplum notatu dignissimum editur cerebri vehementer tussiendo protrusi apud “Edinburgh Medical Essays\*.” Puel-

---

\* Vide Vol. II. Art. 12.

lae, cui caput graviter contuderant testulae lapsae, ossa parietis et frontis inde adeo late scissa sunt, et dein toties perterebrata, ut hiatus amplissimus relinqueretur, ossibus ita sublatis. Dura mater integra superfuit. Victu parcioe et tenuiore adhibito, binis mensibus eo usque aegra ad salutem perrexerat, ut integumenta laesa cicatricibus obducerentur. Die v, post ictum, linamenta vulneri imposita tabula plumbea obtecta sunt, strupis linteis mento et occipiti subjectis firmata. Haec tabula quinque menses retenta est; quibus elapsis, aegra impavida periculi eandem exiit: bene se habuit inde plures menses. Postea *Pertussi* torqueri coepit; qua laborans, nocte quadam adeo vehementer tussivit, ut cicatrices dirumperentur, et inde cerebrum per integumenta extruderetur. Circiter unciae duae ipsius cerebri ex integumentis detergendo remotae sunt. Tunc linamenta et tabula plumbea imposita sunt, ne plus cerebri effundatur; quinque diebus peractis, aegra obiit. Resolutio artuum, stupor, et fluxus urinae sine voluntate fatum antecesserunt. Ex hoc exem-


plo, quod lucidissime indicat eam vim, qua gaudet circuitus sanguinis turbatus, cerebrum extrudendi, docemur, spiritus conditionem acerrimam observationem desiderare; et apprime necessarium esse cerebrum fulcire rationibus, quales supra memoravimus, post singulas *operationes*, quas calvaria subit. Neque enim dura mater, neque cicatrices integumentorum perfectae, neque utraeque, uti exempla supra proposita docent, satis repugnare possunt proclivitati ad ascensum tumoris, ubi calvaria divulsa est.


Nunc tandem orationem absolvi de iis, quae, “QUIBUSDAM CEREBRI TUMORIBUS” inquisitis, didicerim. Quae deducenda e rebus ipsis perpen-  
sis conatus sim illustrare et stabilire, si vera sint, necesse est, gravissimi sint momenti. Quamdiu homines variis istis casibus, quibus vita humana patet, subjiciuntur, capitis injuriae ex ictibus amplissimum habebunt locum in scriptis *chirurgorum*. In hoc genere, cerebri tumores, qui vel directe vel indirecte has injurias sequuntur, praelucebunt, et summum studium desiderabunt. Hos vero nondum idonea diligentia indaga-

tos esse, confido ea, quae supra conscripsi, luculenter monstrasse. Si quid ex his medicorum observationem mereatur, id certe est quod protulerim, ad edocendum, sub iis vocibus *Hernia* et *Fungus Cerebri*, invicem confusa esse saltem ea genera tumorum cerebri, quae his nominibus proprie designantur; ideoque istas voces non amplius ea hucusque solita ratione utendas esse. Si quando id vocabulum *Fungus* rite adhibeatur, aptissimum videtur eo malum a Carolo Bell descriptum designare; nequaquam malo, quod Abernethy testatus est, accommodatur. Pariter alienum foret, intestino aut omento extruso, id malum, *Fungum Intestini*; aut, pulmone e pectore vulnerato protruso, id *Fungum Pulmonis* appellare, atque eidem malo cerebrum sanum male habenti idem nomen imponere: eo que magis, quod cerebrum fortasse in hoc tumore multo minus fabricam et speciem mutatur, quam viscera, quae mox retuli. Si morbis nomina imponenda sunt, ex eorum natura et ratione consideratis deducta, hae voces *Prolapsus*, *Protrusio* aut *Hernia Cerebri* rite tumori cerebri ipsius parte confecto adhi-

beantur. Nulli profecto ex his vocibus tumor, quem Abernethy curavit, aliqua ex parte convenit. Nomen quod saepe imponere ausus sum inter hanc disputationem, scilicet, *Tumor ex Haemorrhagia Cerebri*, minime omnium, quod scio, rejiciendum est.

Quoniam hanc partem medicinae *chirurgicae* adhuc medici immerito neglexerunt, mihi magnae felicitati erit, si quid in hac disputatione editum vel unicam mentem studio humano generi proficiendi flagrantem, ad hoc argumentum utilissimum prosequendum impelleret. Sperare licet, nexum istum consideranti, quo naturae operationes, alia cum alia, committuntur, unius rei inventionem viam patefacturam esse, qua multae aliae explorentur; et mentem, quae semitam veram solum excogitaverit, non frustra neque prorsus sine sperato fructu inquisitionem esse.







---

## ADJICIENDA.

Louis, apud “Memoires de L’Academie Royale de Chirurgie,” quaedam disseruit de morbo durae matris, qui, ut alter cerebro incumbens, Fungus fuit nominatus. Voces eadem malis inter se diversis appositae, haec invicem cognata esse facile menti persuadent: talem equidem opinionem, quamvis falsam, invaluisse hinc patet, quod Louis monstrare conatur peritissimos *chirurgos*, apud Gallos et Germanos, hos duos morbos penitus confudisse. Neque sane mirandum est, vel artis medicae expertos, singularum rerum minutiorum negligentes, quas aliquis studiosus hos proprie discernendi inter se perspiceret, hic errasse; et duos morbos alterum cum altero miscuisse, qui rarius inveniuntur, et pleraque inter se signa communia, habent. Quoniam vero longe discrepant inter se me-

dendi rationem; et salus aegrotantis auxilii idoneis tempestive adhibitis nititur, eo majoris interest tam claris notis eos invicem dignoscere, ut medico satis dijudicandum sit.

Hinc inducor, ut secutura subjicerem de Fungo Durae Matris natura, et iis quae eundem a Fungo Cerebri discernent. Quinetiam, nonnullis videatur me debuisse amplius de Fungo Cerebri disputare: quoniam vero jamjam clare ostendi, quousque hic morbus ab Hernia Cerebri discrepat; et quia Carolus Bell nulla enarravit exempla; et mihimet proposui nil tentare, cui deessent ea, quae ab experientia ducuntur, hinc nolui aliqua conjicere super hac re; et satius esse duxi, quae sequuntur, proponere.

E commentario Louis, ille vir ingeniosus Joannes Bell duxisse videtur, quae de origine morbi durae matris sentiat. Opinatur, duram matrem, quandocunque calvariae dissociata est gravi impetu, aut hujus carie, vel ictum illatum, vel tardius et sponte morbum praegressum sequente, et illius membranae jam disjunctae superficies sanitatem recepit, neque vero iterum

calvariae adhaesit, propensam fieri ut inde tumores verrucis aut fungis similes habeat: qui facti, premendo faciem internam calvariae, efficiunt ut haec partim absorbeatur, et carie resolvatur\*. Simul atque, calvaria ita dissoluta, tumori extrorsum prominere licet, idem assurgit, et, ubi os deficit, extruditur. Nunc tandem tumor spongiosus integumentis velatus, aliquantum durus et prementi cedens, pulsum edere sentitur; qui pulsui cordis et arteriarum, iisdem intervallis, congruens, plane cerebri motu infra tumorem enascitur. Aeger initio multo minus, quam quod expectare liceret, torquetur: leviora mala generis nervosi, dum caries progreditur, adoriri solent. Tumor autem, inter prominendum, parum doloris facessit; ubi vero magno pere increverit, et ejus ima pars scabro margine ossis cariosi strangulatur, sequuntur dolores acerbissimi, turbae graves mentis functionum, nervorum distentiones, &c. Omnes rationes adhibitae ad incrementum tumoris cohibendum,

---

\* Principles of Surgery, Vol. II. p. 400.

aut signa vehementia sedanda, semper aegrotantis spes fefellerunt, aut aerumnas auxerunt. Compressio levis interdum dolorem lenivit, et tumorem externum contraxit: hanc vero curationem stupor adeo periculosus excipere consuevit, ut aeger maluerit dolores perferre, quam tali ratione expediri. Quandocunque incremento tumoris occursum est, exurendo, ligando aut secando, mors subita nunquam non fuit secuta. Curante medico morbi naturae fere ignaro, istis remediis ad fatum praeceps et maturius ferri solet aeger; iniens enim adeo insidiatur hic morbus, tarde obrepens, et fere doloris expers, ut pariter ipse curans et aeger eundem jam primo prodeuntem, minoris aestimandum, et facile manus opere sanandum, judicarent. Quando malum, nulla arte admota, cursum naturalem confecit, aeger plures menses, imo interdum annos, vixit: interdum, sed raro obiit tranquillus; sed multo saepius fatum antecessere animae defectiones, distentiones nervorum, stupor, et excernendorum profusio citra voluntatem.

Haec brevis descriptio Fungi durae matris satis edocet, pleraque ejusdem signa simillima esse quibusdam Fungi Cerebri propriis. Utrique subest tumor pulsum edens, omnibus auxiliis adhuc admotis insanabilis, et eo graviora indicia exhibens, quo magis ampliatur. Hi morbi signa inter se communia habentes, et rariores (unde paucae occasiones oblatae sunt utriusque proprietates cognoscendi) complures *chirurgos* fefellerunt; qui scribendo recensuere uti exempla utriusque, mala, quae inquisitio acrior docet, longe ab iis aliena fuisse, pro quibus aestimata sunt. Imo etiam Louis ipse, qui, illis “Tumeurs fongueuses de la dure mere” accurate indagatis, summas meretur laudes, non, uti opinor, recte aut exacte depinxit eas proprias notas, quibus invicem hi morbi dignoscuntur. Opinatus malum, de quo commentatur, nunquam non ab origine durae matris soli incubuisse, facile sibi persuasit Fungum cerebri vix aliquid habere cum hoc commune, nulla difficultate, ab eo discernendum. Ambroise Parè scriptis mandavit, tumorem pulsum edentem

foeminae capiti insedissee. Signa enarrata similia sunt iis quae membranae tuberibus spongiosis contingunt. Hoc viro insigni adversante, tumor incisus est; et cerebrum protrusum fuisse dicitur. Aegrae mortuae cadaver secuerunt duo chirurgi, et Parè nunciarunt malum, quo foemina laboraverat, Herniam Cerebri fuisse, calvaria simul ibi deficiente. Louis, agens de mali descriptione, quam Parè edidit, et studiosus comperiendi hoc Fungi durae matris exemplum existere, opinionem jam dictam respuit, testimonio, quo eadem nititur dubio existimato. Porro haec verba habet: “ C’est une erreur;” scilicet malum, de quo agitur Herniae Cerebri exemplum fuisse, “ car le cerveau contenu par la dure-mere, et par le crâne ne peut franchir la résistance que ces parties lui opposent. Pour que le cerveau pût former une Hernie, il faudrait que l’os fût détruit primitivement par quelque cause que ce fût; et qu’il y eût pareillement une solution de continuité à la dure-mere. L’expérience a montré en maintes occasions, que dans les plaies de tête, accompagnées d’une

grand déperdition de la calotte osseuse, il n'y a point eu de protubérance du cerveau, tantque la dure-mere a contenu ce viscere; et dans les cas mêmes où cette membrane a souffert déchirement ou incision *l'expansion de cerveau n'a eu lieu, que par une altération particuliere de sa propre substance* à la suite de sa lésion\*.”

Non opus sit hic loci inquirere necne verisimile sit, duos chirurgos, incisum et inspectum tumorem post mortem, pro Herniae Cerebri exemplo aestimasse, qui *sarcomatosum* communem referre comperiri solet, a cerebro molli et delicato fabricam alienus, quantum hoc efficere possent actio morbida, et pressura diuturna. Neque consilium est causas explorare istius insolitae hebetudinis, qua peritissimus inter omnes chirurgos, qui Galliam aut orbem terrarum tunc temporis illustrarunt, non satis eas rationes aestimavit, quas Louis opinatur eum illico docuisse oportere, quam absurdum et alienum esset, tam vagae inquisitioni confidere, et existimare ma-

---

\* Memoires de L'Academie Royale de Chirurgie, Tom. X. p. 11.

lum, quod prosequor, Herniam Cerebri existere posse. Hoc lectori sagaciori expediendum relinquo; quasdam res in oratione jam citata memoratis nunc expositurus, quas animi intentione haud levi dignas esse judico.

Mihi satis liquet Louis, quando affirmat crebrum nunquam extrudi, nisi ejus fabrica proprie mutata, in istum errorem jam toties memoratum incidere, scilicet Herniam et Fungum Cerebri invicem confundere, quae mala insigniter inter se discrepare naturam, signa, medendi rationem, et ejusdem adhibitae effectum docent exempla proposita: rem profecto ita se habere clarius adhuc e proferendis patebit.

Porro, signum, cui maxime Louis ad discernendum fedit, quod si semper responderet, haec mala invicem dignoscere non profecto difficile foret, derivari videtur ex angusta et imperfecta scientia naturae et causarum tumorum variorum cerebri, et ea propria ratione, quam amplexus est, Fungi durae matris ortus, Calvariam plerumque vi aut arte divelli, et duram matrem laedi priusquam Fungus Cerebri accedat, nequeo



non concedere. Neque vero animo perpendere possum, hujus mali naturam, multa ejus exempla in scriptis medicorum reperienda, et pleraque ejus signa mali durae matris propriis simillima, quin statuum idem frequenter oriatur, et prodiret quasi tumor infra integumenta, calvaria non prius sublata nisi actione vasorum absorbentum, praesentibus quodam morbo et pressu.

Imprimis, ostendere conabor sententias, quas complexi sunt Louis et Joannes Bell, de Fungi Durae Matris natura fere contrarias esse verae signorum rationi, qualia in plerisque ejus exemplis, quae traduntur, reperta sunt. Deinde, pauca disserenda erunt de causa magnopere utriusque morbi ortui favente; et eandem cerebro affuturam esse, quam verisimile est considerandum; causam, quae polliceri videtur integram resolutionem quarundum quaestionum inter hos morbos agitandos occurrentium.

I. Dominus Louis opinatur morbum, cui nomen Fungus Durae Matris inditur, ejus membranae ab ipsa origine proprium esse; et tumorem, paulatim increcendo et premendo, calva-

riam incumbentem labefacere. Joannes Bell hanc sententiam amplexus, morbum propositum dura matre e facie calvariae interiore divulsa enasci judicat; porro sentit sanationem hujus membranae antea plaga laesae, non simul se cum calvaria per vasa committentis, tuborum spongiosorum ortum antecedere et juvare. Sententiae in lucem editae, quibus hi tam eximii viri uti sunt, existimatione ingenio debita sunt excolendae: confitemur tamen nos non posse perspicere illud vinculum inter causam hic propositam et effectum intercedere, quod subesse oportere, considerantes ullam *Hypothesin* rejicimus aut complectimur, prout absit, aut invenitur. Quod ad sententiam Joannis Bell, scire licet duram matrem necesse esse ictu, lapsu aut quovis alio casu, simul non operam conferente sanguine effuso interjecto, rarissime e facie calvariae interiore dissociari. Haec membrana adeo arcte adhaerescit calvariae, cui *periosteo* interiori existit, ut non statim ictu sejungatur, nisi vasa sanguinea laedantur, et sanguis intus profundatur; quae profusio cito propriis signis

indicetur. Exempla vero, quae Joannes Bell citavit, durae matris e calvaria separatae, non eas notas prae se tulisse videntur, unde illud statuere liceat \*. Quinetiam, indicia morbi, quem prosequor, maxime notanda sunt, dolor nullus omnino praesens, neque cerebri functiones turbatae, denec tumor insigniter increseat. Dura mater, homine sano, sensu penitus vacat; at vero, adinstar aliarum istarum partium, quibus contingit exilior vis vitalis, haec morbida mirum in modum sentit; et quodcunque premendo inflammationem intendit, id verisimile est dolorem acerbum excitaturum esse. Hoc morbo igitur durae matris solius ab initio proprio existimato, calvaria incumbens tumoris incrementum impediendo, ea signa irritationis citura esse videatur: at vero per hujus morbi cursum, ab ictu primo illato, ad tumorem sub integumentis prodeuntem, nulla talia signa accedere solent. Interdum aeger ne quidem levissimam molestiam patitur; imo etiam, ubi tumor pulsum edere ob-

---

\* Vide "Principles of Surgery," p. 398 ad 403.

servatur, pessimum signum, eundem tamen maxime omnium tumorum, quibus male haberi posset, innoxium esse credit, et remediis aut nullis utitur, aut qualia solummodo morbum levare, non sanare, valent. Dolor gravis aliaque signa infelicia non adoriri consuerunt, donec (uti supra dicti viri opinantur) cervix tumoris duro margine calvariae strangulatur. Insuper, signa cerebri oppressi absentia in hoc morbo difficultatem praebent; haec res enim nequaquam sententiae Domini Louis et Joannis Bell de morbi natura accommodari potest. In solitis injuriis, quas caput patitur, signa moestissima et simul clarissima cerebri oppressi, pus aut effusum sanguinem inter calvariā et duram matrem consequuntur: neque tam periculosa signa prorsus oriuntur ab ista incitata vasorum actione, quae sanguinem e vasis effusum aut pus secretum comitatur. Si enim materia aliena, quae cerebrum opprimit, celeriter tollatur, statim inde ejus munera integerrima fiunt et rite perficiuntur, id quod scripta Dominorum Abernethy et Hill clarissime docent. Si hic morbus

ab origine durae matri soli incumbit, nescio quae res ei inter progrediendum accedentia ita agant, ut cerebrum immune a pernicie servant, quae superventura esse videtur tumori ei membranae accrescenti et ex ea profecto, cujus ascensui calvaria obtegens fortissime obnuitur. Contra tamen perhiberi potest, cerebrum, ut experientia fere quotidie ostendit, diu impune haud parum opprimi posse: hoc conceditur; at vero nonne quodammodo pendet ex omnibus iis partibus inflammationis alicujusve acuti mali puris, quarum munera ad cerebri salutem necessaria sunt? Pott aliique curatione forti et valida usi sunt, eo quod inflammationem durae matris instare metuerunt. Ille eximius chirurgus hanc semper valde metuisse videtur, et inde cura insolita ejus perniciosos effectus praecavisse. Quoniam ea actio, qua fiunt tumores, plerumque motu incitatore vasorum ad eosdem pertinentium stipatur, expectare licet signa iis similia, quae durae matris aliquam inflammationem praedicant, ortui tumoris spongiosi ejus membranae accessura esse. Quum in plerisque exemplis hujus mali scriptis

mandatis, haec et supra memorata signa malorum durae matris propria, non inveniuntur, valde dubitandum est, necne morbus Fungus Durae Matris nominari solitus, plerumque sit tumor ex ea membrana exortus, qui calvariam premendo sensim labefacit. Sed quoniam signa supra relata (nimirum, dolor et turba cerebri functionum) quibusdam exemplorum ejus affuisse memorantur, est quare crederemus hujus morbi rationem antea prolatam interdum signis explicandis idoneam esse, qualia aliquando contingunt, ubi tumor est, et calvaria deficit.

Quae objecerim sententiae Dominorum Louis et Joannis Bell de natura plerorumque ejus mali exemplorum, quae, ut Fungi Durae Matris exempla, citarunt, sunt qualia mihi inter eorundem scripta legenda, occurrerunt: quae proposuerim valeant necne lector judicet, et quia hoc argumentum grave et utile est, sed minus ad meum propositum pertinet, idem amplius inquirere nolo; sperans lector pauca secutura penitus animo committeret; quae sane amplissime agitare vetant angusti, quibus contineor, limites.

1. Plerique tumorum, quorum Dominus Louis meminit, *sinibus venosis* cerebri impositi sunt; *nunquam vero ut credo, memoratur horum cava deleta esse.*

2. Quibusdam ex his tumoribus frusta ossea inhaerescere secando reperta sunt. Resne ita se habuisset, si calvaria ibi vasis absorbentibus sublata esset, propter tumorem comprimentem e dura matre sola exortum?

3. Inter omnia horum tumorum exempla tradita, haud ullus integumenta sustulisse et ita extrorsum prodiisse memoratur; etiamsi aegri saepe plures annos, tumore sub integumentis jacente, vixerint; et in multis aliis exemplis, tumor, calvaria, quae eum impedivit, tandem remota, multo minus inde increvit, quam alii tumores, caeteris paribus, maximeque quales *spongiosi* tumores vel *Fungi* nominantur.

4. Tumoris incrementum, quando percipi potest, dolorem et turbas generis nervosi semper maxime accedere notavi pro ratione irritationis inductae, et compressionis extrinsecae for-

te aut arte admotae. Quanti sit momenti quod jam nunc dixi, paulo post apparebit.

II. Quum tandem refellere conatus sim sententias hucusque acceptas de natura et prima sede morbi, qui Fungus Durae Matris vocatus est, proximum est paucis proponerem rationem, ut mihi saltem videtur, verisimiliorem hujus mali progressus et signorum; ad melius invicem discernendos durae matris et cerebri tumores.

Quantum *calvariae contusio*, aut aliquid ejusdem malum, efficiens ut os resorbeatur, ad morbum gignendum valeat, omni fere ex parte ei similem, qui hucusque Fungus Durae Matris appellatus est? Vel, partibus ita, ut jam proposui, existentibus (nimirum, calvariae ossea parte resorpta), *pericranio*, *tela cellulosa*, et dura matre, inter integumenta et tumorem cerebri *pulsatilem* interjectis et compressis, quae actio nova aliqua noxa excitante admota enatura esse videtur? Nonne experientiae consentaneum est expectare ea vasa, quae integra os secreverunt, sana sua actione nunc morbida mutata, insolitam incitationem habitura esse, et istam



materiam morbidam secretura, quae, propter similitudinem, Fungus nuncupatur? Si talis affectus semel incipiat, ejus incrementum et diffusio irritatione vel interna in ipso corpore, vel adventitia noxis externis orta, valde promoverentur, et cito tumor prorsus a calvaria circumdante separetur. Si compertum esset hoc interdum evenire, non dubitabo asserere idem omnino hujus mali insidiosae naturae rationi exponendae habile fore; scilicet ejus sine dolore ineuntis, tardi incrementi, diu absentium cerebri functionum turbarum, adeo notabilium in hujus mali historia; et quae nullo modo sentiis, quas refellere conatus sum, accommodari possunt. Quinetiam, sententia, quam proposui, satis rationem reddit tumoris fabricae; qui potius *scirrhum*, qualis mollioribus partibus contingit, quam tuber spongiosum refert. Durae matris etiam, quam Domini Louis et Joannes Bell morbi sedem primam esse judicant, facies interior quam minime mutari aut corrumpi solet, scilicet, quae ad tunicam *Arachnoideam* spectat: quae res profecto magnopere ei opinioni adversatur,

nempe, ejus vasorum actionem morbidam hoc malum gignere; sed satis bene explicatur, si opinemur potissimum calvariae vasa sola male se habere.

Concesso igitur hanc *Hypothesin* multo verisimiliorem esse, quae sine dubio signorum rationem simpliciore et clariorem reddit, quam sententiae Dominorum Louis et Joannis Bell, proximum est, ut inquiram quousque pars calvariae resorpta, illaesis simul integumentis, ad Fungum Cerebri gignendum valeat. Omne malum, quod ut calvaria, cerebri tutamen, dimoveatur efficit, hoc ad malam valetudinem proclive reddit: illa igitur sublata, cerebrum durae matri fulcro privatae illiditur, et eo validius, quo incitatore motu ejus vasa agitantur, auxiliante simul renixu debili, quem nudata dura mater edere potest; membrana ita illisa margini aspero calvariae vel ad actionem morbidam incitabitur, vel exasperata exulcerabitur: *illic* Fungum Durae Matris, *hic* Fungum Cerebri accessurum verisimile est. Fungum Cerebri hac ra-

tionem fieri posse, sententiae Caroli Bell consentaneum esse videtur; cui placet aliquam injuriam durae matri illatam, nempe aut aspera te-  
rebra, aut scabro margine calvariae irritatam, semper hunc morbum antecedere. Porro, descriptiones a plerisque auctoribus editae malitiam, quam proposui, favere videntur; hi scilicet exempla tradidere, quibus tumores integumentis subjecti, e cerebri ipsius parte confecti, prae falsa opinione de eorum natura, ferro patfacti sunt<sup>k</sup>.

Priusquam finem imponerem orationi de Fungo Durae Matris, oportet paucis exponere quare tam late a proposito praecipuo digressus sim. Mihi haud levis esse momenti apparuit edocere, aliter atque Dominus Louis sentit, Fungum Cerebri oriri posse, imo saepe oriri, e causa, quae malo durae matris proclivitatem praebuit, integumentis integris. Hac re comperta, maxima opus erit cura ad hos duos morbos rite invicem discernendos; et simul ne alter cum altero confundatur, multo minus metuendum erit.

Nunc igitur, quam brevissime potero, eas res in utroque observandas proferam, unde inter se clare dignoscantur.

1. Si idonea animi intentione prosequamur signa, quae his morbis jam ineuntibus contingunt, non difficile erit accurate discriminare. Fungus Cerebri prominere coepisse a Carolo Bell notatur paulo post ulceratam duram matrem; ei jam incipienti adsunt rigores, dolores capitis, anxietas et fastidium cibi. Haec mala cerebro oppresso cito excipiuntur; et nisi auxilia apta praebeantur, mors in genere intra quatuordecim dies aerumnas finit.

2. Fungus Durae Matris incipere et: quamdiu perstare solet, genere nervoso levissime turbato, neque unquam signis mali vehementioris prodeuntibus. Fungus Cerebri sine dubio acutissimus, Fungus Durae Matris potius longus morbus existit; interdum hic fere omni molestia vacat; alias dolores graves excitat, qui vicissim modo urgent, modo quiescunt: aeger haud raro plures annos tentatur.

3. Fungo Cerebri tumor est mollis et

prementi digito cedit; pulsu manifesto agitur, eo validiore sine dubio, quo signa vehementiora subsint, et quo incitatore actione vasa cerebri polleant.

4. Contra, Fungo Durae Matris tumor durus prementi alicui renititur, longe alienus e molli tumore cerebri exulcerati; pulsum multo obscuriorem habet, qui sensim debilior et perceptu difficilior evenit, adaugescente tumore.

5. Si Fungus Cerebri, quando tumor ab aere aliisque noxis extrinsecis immunis conservatur, diutius progrediatur et permaneat quam alias, ubi calvaria et integumentis nudatur, exiguitas hiatus in calvaria, quo tumor ascendit, satis ad eum a Fungo Durae matris discernendum valebit. Etenim in Fungo Cerebri, tumore molli, neque insignem magnitudinem habituro, calvariae non plus delebitur, quam quod vasa absorbentia sustulerint post eandem contusam aut quovis alio malo laesam.

Quoniam Fungus Cerebri et proprius iste Fungus Durae Matris potissimum calvariae

perterebratae aut explicitae supervenire possunt, hinc maximi eos invicem dignoscere medicorum interest. Hoc vero, ni fallor, luculenter fieri potest, jam dictis (1, 2, 3, 4,) probe in animo perpensis; et illud semper memoriae committere oportet, duram matrem necesse esse prius dimoveri, quam tumor Fungo Cerebri extrorsum prominere possit.

## ANNOTATIONES.

---

[<sup>1</sup> p. 5.] **PLERAQUE** ex antiquorum et primorum inter recentiores scriptis citare licet, istius imperitiae documenta, qua caput ictu laesum curare soliti sunt. “ In omni fissio  
“ fractove osse,” ait Celsus, “ protinus antiquiores medici  
“ ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent.” Medicus ille Latinus, quancunque Graecas literas et medicinam aestimaverit, sagax tamen a curatione ista rudi et inculta, de qua hic locutus est, abhorruit; et emplastra ferramentis ipso initio praeposuit. (Vide Libr. VIII. caput 4. de Calvaria fracta.) Quoniam vero plerique homines auctoritatem rationi anteponunt, et illam vetustate metiri solent, *chirurgi*, qui seculis decimo sexto et septimo, et ineunte decimo octavo florebant, antiquorum vestigiis instituisse videntur, et Celsi solertiam Hippocratis *aphorismis* posthabuisse. Ille vir praeclarus Baro Van Swieten, apud

commentarios celebres, amplissime de capitis percussi curatione, suis temporibus usitata, disseruit. Ea vero citare ex hoc opere excerpta, quae doceant, quanti medici etiam illo florente levissima calvariae vulnera inepte habuerint, *caput* omnino exscribere foret: Perlegat aliquis commentarium aphorismo CCLV appositum.

[<sup>b</sup> p. 5.] Imo etiam usque ad ipsum tempus, quo floruerunt illi praeclari viri Petit et La Motte, in omni vulnere capitis integumentorum, cui horum pars e subjectis divelleretur, pendula, hanc omnino excidere medici consueverunt, et omnibus rationibus ope summa niti, ut exterior calvariae tabula explicetur.

[<sup>c</sup> p. 52.] “ M. Maréchal rapporte, qu’une personne guérie d’une grande playe de tête, où une portion un peu considérable du crâne fit emportée, avoit de tems en tems des convulsions dans lesquelles elle perdoit connoissance. Il se douta que ces accidens venoient d’un étranglement que souffroient les meninges poussées par le cerveau dans l’endroit où le crâne avoit été ouvert; ce qui formoit à cette endroit une espece de hernie. Pour y remédier, M. Maréchal fit faire un bandage ou espèce de brayer, avec une petit écusson qui portoit sur la cicatrice; par ce moyen il fit cesser pour toujours les convulsions et leurs suites.” *Memoire Cinquieme, par M. Quesnay, Tome Premier.*



[<sup>d</sup> p. 53.] Fortasse proponere liceat, uti praenuncium certum et proprium Herniae Cerebri, duram matrem aliquanto antea divulsam esse, quam tumor prodire coeperit. Non nisi bis, omnibus de re chirurgica scriptis evolutis et diligenter inquisitis, id non prius accidisse traditum esse reperio : hic, tumoris ascensus secutus est duram matrem, ipso cerebro eam impellente, cui solita reniti defuere, per amplos calvariae hiatus extrusam, et inde resolutam et emortuam ideoque separatam. (Vide “ Principles of Surgery, by John Bell.”) Exempla sola, quae Dominus Hill praebuit, demonstrare videntur Herniam Cerebrae matris incisae junioribus et vegetis fere inevitabilem esse effectum. Idem medicus, hanc membranam secandi adeo pertinax, id faciendo quinque aegris cerebrum nudavit ; quorum quatuor cerebrum inde protrusum fuit ; reliquus ante obiit, quam tumor fieri posset. (Vide “ Cases in Surgery, by James Hill, surgeon in Dumfries.”)

[<sup>e</sup> p. 54.] Quae sequuntur, a nuperrimo *physiologo* Richerand proposita penitus iis, quae supra disserui, consentanea sunt. Quoniam hic auctor solus clare exposuit rationem cerebri vicissim se attollentis et submittentis, id quod calvaria jam vivi animalis remota apparet, et quicquid obscuri hoc obumbraverat, sustulit, et hanc rem momentosam cognoscere maxime oportet, ut pleraeque cerebri tumorum proprietates et signa aptius aestimentur ; quae ille auctor de hoc motu cerebri scripsit, multo amplius, quam si aliter se res habuisset, citare volo.

“ *Les mouvemens alternatifs d'élevation et d'abaissement que présente le cerveau mis à découvert, sont-ils exclusivement isochrones aux battemens du coeur et des artères; ou bien ces movemens correspondent-ils en même temps à ceux de la respiration?* ”

“ Nous observons que les principaux troncs artériels qui se portent au cerveau, sont placés à la base de ce viscère; que les branches dans lesquelles ces troncs se partagent, et les rameaux que ces branches fournissent, sont aussi logés à sa base dans les nombreux enfoncemens dont elle est sillonnée; et qu'enfin les artères du cerveau ne pénètrent sa substance qu'après avoir subi dans le tissu de la pie-mère, qui en paroît uniquement composée, des divisions extrêmement multipliées.

“ Les vaisseaux qui rapportent la portion de sang qui n'a point été employée à sa nourriture et à son accroissement, sont au contraire placés vers sa partie supérieure, entre sa surface convexe et la voûte du crâne. Là, chaque anfractuosité est parcourue par une grosse veine qui va se rendre au sinus longitudinal supérieur. Les veines de Galien, qui de l'intérieur des ventricules, rapportent au sinus droit le sang distribué aux plexus choroïdes; quelques veinules qui se dégorgent dans les sinus caverneux et communicans; quelques autres, aussi très-petites qui, passant par les trous dont sont percées les grandes ailes du sphénoïde, vont concourir à la formation du plexus veineux de la fosse zygomatique, forment seules exception à cette règle générale.

“ Ceci posé sur la disposition des vaisseaux artériels et veineux qui se distribuent au cerveau, examinons quels doivent être les effets de leur action, relativement à ce viscère.

“ Les contractions du cœur chassent le sang dans les tubes artériels, qui éprouvent, surtout aux endroits de leurs courbures, un déplacement marqué, en même temps qu'ils se dilatent. Toutes les artères placées à la base du cerveau éprouvent ces deux effets à la fois. Leurs efforts réunis lui impriment un mouvement d'élévation auquel l'abaissement succède, quand revenant sur elles-mêmes, elles réagissent sur le sang qui les remplit.

“ Ces mouvemens n'ont point lieu tant que le crâne conserve son intégrité. Cette cavité est trop exactement remplie ; il ne se trouve aucun espace vide entre les membranes du cerveau.”

“ On conçoit néanmoins que le cerveau mol et peu consistant, cède à la légère pression qu'exercent sur lui ses vaisseaux artériels. Cette action continuelle du cœur sur le cerveau, n'explique-t-elle pas d'une manière satisfaisante, la sympathie remarquable entre ces deux organes, liés par de si étroits rapports ? Elle a en outre une utilité bien évidente, et relative au retour du sang distribué à la masse cérébrale et à ses enveloppes. Les veines qui le rapportent, alternativement comprimées contre la voûte du crâne, se dégorgent avec plus de facilité dans les sinus de la dure-mère, auxquels elles se rendent sous un angle

*rétrograde et défavorable au cours du sang qu'elles y versent."*

“ Il ne suffit pas de prouver pas des raisons tirées de la disposition des parties, que les mouvemens du cerveau lui sont communiqués par l'ensemble des artères placées à sa base, il faut encore établir ce fait sur l'observation, et le rendre incontestable par des expériences positives. Voici celles que j'ai tentées pour arriver à ce but :

“ a. J'ai d'abord répété l'observation de quelques auteurs, et reconnu comme eux que les pulsations senties en plaçant le doigt sur les fontanelles du crâne des enfans nouveau-nés, correspondent parfaitement aux battemens du coeur et des artères.

“ b. Un malade, trépané pour une fracture avec épanchement sous la dure-mère, m'a offert le cerveau s'élevant et s'abaissant alternativement. L'élévation correspondoit à la diastole ; l'abaissement à la systole des artères.

“ c. Deux chiens trépanés ont présenté le même phénomène dans le même rapport avec la dilatation et le resserrement de ces vaisseaux.

“ d. J'ai enlevé avec précaution la voûte du crâne sur un cadavre d'adulte. La dure-mère, dégagée de ses adhérences avec les os qu'elle tapisse, fut conservée parfaitement intacte. Je mis ensuite à découvert les carotides primitives, et j'injectai de l'eau dans ces conduits. A chaque coup de piston, le cerveau offroit un mouvement

d'élévation bien sensible, surtout lorsque l'injection étoit poussée en même temps par les deux carotides."

" k. L'ouverture du sinus longitudinal supérieur, la seule qu'il soit facile d'effectuer, n'affoiblit point les mouvemens du cerveau. On observe que le sang en sort plus abondamment durant l'élévation."

Richerand pleraque alia experimenta instituta tradidit; jam dicta tamen, ceteris ommissis, satis valent. Tandem ad secuturum propositum venit.

" L'on peut donc regarder comme une vérité rigoureusement démontrée par l'observation, l'expérience et le raisonnement, la proposition suivante :

*" Les mouvemens que présente le cerveau mis à découvert, lui sont exclusivement communiqués par les pulsations des artères placées à sa base, et sont parfaitement isochrones aux battemens de ces vaisseaux."*

[<sup>f</sup> p. 57.] Duo Herniae Cerebri exempla a Joanne Bell memorantur; vide "Principles of Surgery," Vol. II. p. 801—803, &c. Quatuor ejusdem e Domino Hill, Dumfreinsi; vide "Cases in Surgery." Unum a Doctore Maclagan traditur; vide "Vol. I. of Medical Commentaries."—Unum etiam apud "Edinburgh Medical Essays," (Vide Vol. II.) Vide etiam exemplum apud Medical Museum, Vol. IV. Et aliud apud "London Medical Journal," Vol. X.—Apud "Memoires de l'Académie Royale de Chirurgie," Vol. I. narratur exemplum. Duo a Domino Hey scriptis mandantur; vide "Practical

Observations in Surgery." Duo exempla a Fabricio Hildano edita sunt; vide "Centur I. Observ. xiv. et xv." Novissime cito exemplum a Sculteto prolatum; vide "Armament. Chirurg. Obs. xix."

Aliqui ex tumoribus, quos auctores supra dicti descripserunt, ab ipsis Fungi nominantur; sed omni fere ex parte speciem prae se ferunt ejus mali, quod cerebrum ipsum protrusum judicamus.

Opera, quae infra citavi, in libro Ploucquet enumerata, pleraque exempla tradita continent: hic auctor omnia complectitur, sub titulo "Hernia Cerebri." Visum est haec subjicere, uti fontem, unde harum rerum studiosi multum utilis excerpant. Pleraque ex his exemplis, quae reperire potui, plane sunt Herniae Cerebri infantium jam natorum descriptiones.

Comment. Lips. Vol. V. p. 449, ex "Gentleman's Magazine."

Corvinus, Diss. de Hernia Cerebri. Argent 1749.

Ephem. Nat. cur Dec. II. Ann. I. Obs. 167. (ex cranio carioso.)

Ferrand, Memoires de Chirurgie, Tom. V. n. 2. (compressione sanata.)

Held, Diss. de Hernia Cerebri, &c. Giessae, 1777. (sanata in adulta.)

Henkel Samml. Med. und Chir. Anmerkungen VIII. n. 17.

Hoogveen, de Morbis Foetus Humani. App.

Monro in Medical Transactions, II. n. 18.

Mosque Chirurgische Novellen, (compressione sanata.)

Mursinna, Beobachtungen I. n. 8. (compressione sanari.)

Salleneuve, Dissert. de Hernia Cerebri, Argent. 1781.

Schneider, Chirurgische Geschichte. X.

Siebold, Observ. Med. Chir. Fascic. I.

[<sup>g</sup> p. 57.] Haec verba e libro hujus auctoris ingeniosi excerpti, quae doceant quam propensum sit cerebrum apud juniores ad prominendum. Ulterior hujus orationis pars, *per literas Italicas* excusa, qua constat Dominum Joannem Bell, Fungum et Herniam Cerebri invicem confudisse, (in quem errorem nunquam non incidit, quoties de hoc argumento disputat,) solum citatur, quo sententia auctoris clarior fiat; minime quia ei assentiri possum.

[<sup>h</sup> p. 59.] Si huc accedat, strumam aetate tenera cerebri ascensui favere posse videri, quae tetra labes potissimum ei aetati addit, vasorum tunicis in eo genere valetudinis perquam resolutis, validissimas habemus rationes, quare credamus, Herniam Cerebri admodum ejus vasorum statu apud infantiam et juventutem pendere et juvari.]

[<sup>i</sup> p. 93.] Sententiae eximii illius chirurgi, cujus supra memini, cum amico meo Doctore Vose, qui, me rogante, quaesivit, communicatae sunt. Ex eodem didici non solum Dominum A. Cooper, sed etiam Dom. Chandler et Lucas Seniore, apud Valetudinaria Sancti Thomae et Guidianum Londinensia curantes, simili modo,

linamentis et strupis emplastro resinoso illitis impositis, compressisse in plerisque Herniae Cerebri exemplis; idque nunquam non eventu felici. Quamvis ei viro insigni A. Cooper quam plurimos cerebri tumores testari et curare accidit, memoratu tamen dignissimum est, hunc illustrem *Pathologum*, nullo omnino habito discrimine, omnes commiscere, nomine *Fungus* indito; etiamsi omnes, uti cerebri protrusi exempla, feliciter curaverit. Hinc non absimile videtur *Fungum* proprium rariorem esse; nemo inter scriptores, quod scio, nisi Carolus Bell, tale malum exacte depinxit; imo ipse, qui bis solum idem vidit, quasi uam experientiam aliena firmandi impotens, nulla similia exempla aliunde protulit.

[<sup>k</sup> p. 97.] Perhibuit Louis, plerosque e talibus tumoribus revera durae matris tumores spongiosos extitisse: et certior factus sum quaedam ejus membranae vitia eo usque cerebri ipsius speciem prae se ferre, ut alicui facile videantur hujus propria existere. Porro objici potest iis quae disserui de cerebri tumore sub integumentis per calvariam alicubi hiantem prominendi potente, haudquaquam verisimile esse os absorberi, duram matrem summoveri, Fungum e cerebro ascendere, et integumenta adeo mollia esse, ut tumori prominere liceat, Fungum Durae Matris simulanti. Controversia vero exuta, talem tumorem fieri posse, lucide patet, ex iis quae apparuere, cadavere inciso alicujus, cui malum enarratur apud Vol. II. libri "London Medical Transactions."



## APPENDIX,

PRAECIPUA EX EXEMPLIS, IN DISPUTA-  
TIONE PRAEGRESSA CITATIS,  
COMPLECTENS.

---

*Exempla Tumorum ex Haemorrhagia Cerebri, e scriptis  
Domini Abernethy excerpta.*

### EXEMP. I.

“ A boy, about fourteen years of age, fell from a scaffold, near two stories high, and pitched on his head. When brought from Islington to the hospital, he appeared to be almost in a dying state. The anterior inferior angle of the parietal, and part of the frontal bone, were found depressed. A piece of the cranium being taken out with the trephine, I discovered beneath it a large quantity of coagulated blood; I therefore made the next perforation nearer to the trunk of the principal artery of the duramater, from which I concluded that this haemorrhage had taken place. Having gently removed some of the coagu-

lum, and introduced my finger into the aperture which had been made, I passed it as far as the second joint, before I could touch the dura mater. Fluid arterial blood now gushed out in such quantities as to keep the bone covered, on which I was next to trephine. I ran no risk, however, in performing the operation; for the dura mater was depressed so much that it could not be injured. But to guard against even the possibility of such an accident, I introduced my finger between the dura mater and skull, and then perforated the bone with the trephine. Having thus removed a third piece, which was directly over the principal artery, I took out about four ounces of coagulated blood; upon which the dura mater quickly rose to its original level, and the haemorrhage from the wounded artery ceased. I now entirely removed the depressed portion of bone, and thus uncovered all the dura mater which had been detached; so that I could distinctly feel its connection with the cranium all round. This satisfied me that no more extravasated blood was left behind.—The lad, who at the beginning lay quite insensible, with a feeble, intermitting pulse, and laborious interrupted respiration, became restless, and expressed sensations of pain towards the latter part of the operation. Being now asked, how he found himself? he replied, very well: Whether his head ached? he answered, no: If he was sure that he felt no pain? he said he was sure, and wished we would leave him alone.—I now took twelve ounces of blood from his arm, and he was put to bed, where he passed the night

quietly. The next morning his bowels were completely emptied by a purge ; and saline medicines, with antimony, were given, so as to keep the skin in a gentle state of perspiration. During the day he was sleepy, and lay quiet ; answered questions very rationally, and complained of pain and giddiness in his head.—The third day he was disturbed, and less rational. Eight ounces of blood were taken from him, and a blister was applied to his neck. These means relieved him greatly, and he became quite tranquil and collected.—On the sixth day, symptoms of irritation again took place, and were again relieved by similar treatment. The dura mater had granulated, and the whole wound looked healthy. Every thing went on remarkably well until the fifteenth day, when the patient was seized with rigour and pain in his head, and the healthy aspect of the wound was also changed. The following day, there was perceived, in the middle of the exposed dura mater, an aperture, through which a protrusion of the brain arose, covered by the pia mater, which retained its natural appearance. In less than twenty-four hours this tumour increased to the size of an orange ; its surface was dark, coloured, and irregular, and the pia mater no longer distinguishable. The following morning the boy died ; and his friends had removed the body from the hospital before I knew of his decease.

“ I regretted very much that I could not examine the nature of this fungus or hernia cerebri, as it was a phenomenon which I had more than once contemplated with

surprise, and the nature of which I was afterwards fortunately enabled to ascertain.”

## EXEMP. II.

“ A man, about forty years of age, was knocked down, and had a considerable part of the parietal bone, near the coronal suture, depressed, by a stone falling on his head from a high building. A portion of bone was taken out, and the depressed piece elevated. The patient, after this, seemed to obtain great relief from the stupor under which he had till then laboured. But the next day, he became very restless and delirious, and frequently endeavoured to get out of bed. Evacuations were prescribed, and a blister applied to his head, by which means the symptoms were lessened, but did not entirely go off; they continued near six days, only varying somewhat in degree. His strength was now very much reduced; and though he became more tranquil, he was still delirious, and a coma supervened, which increased daily.—On the tenth day, upon uncovering the wound in order to dress it, a hernia cerebri appeared, rising through an ulcerated opening in the dura mater. The tumour at this time was not larger than a pigeon’s egg; the pia mater, stretched over its surface, was inflamed; and a turbid serum oozed at its side, from beneath the dura mater. On the following day, the tumour had acquired the size of a hen’s egg.

was still smooth on its surface, and apparently ready to burst. On the day after, before the time of dressing, the man died.—Upon examining the tumour now, it was found larger than before, and of a dark colour, with an irregularly granulated surface; which appearance seemed owing to coagulated blood which adhered to its surface, as the part had bled so much, that one half the cap which the man had worn, was rendered quite stiff by it. In raising the top of the skull to inspect the contained parts, the tumour was in some degree torn from its basis. The pia mater was in general much inflamed, and, as well as the dura mater, was deficient at the place where the tumour protruded. A part of this tumour being cut off where it was lacerated, appeared to consist of coagulated blood of a fibrous texture. The brain was now taken out, and the tumour carefully examined, when it was found to be of the same nature throughout, and to have originated within the substance of the brain, about an inch below the surface; but I could not discover the open vessel from which the hæmorrhage had proceeded.

“ The appearances, on dissection, clearly explained the cause of the symptoms which had taken place, and rendered it evident, that the disease under which this man had chiefly laboured, was inflammation of the pia mater. The nature of the tumour, also, was not less satisfactorily pointed out. It was plain that, in consequence of the brain being injured to some depth beneath the surface, disease of the vessels, and consequent effusion of blood,

had ensued; that the effusion was for a time restrained by the superincumbent brain and its membranes; but these gradually yielding to the expansive force exerted from within, and at last giving way altogether, the fluid blood oozed out and congealed upon the surface of the tumour. *It appears very probable, that the disease generally described by the term hernia cerebri, consists, as in this instance, of a tumour formed by coagulated blood; for an organized fungus could hardly be produced in so short a time as that in which these tumours are usually formed.*"

### EXEMP. III.

" A carpenter, while at work in a newly-built house. was crushed by a part of the wall falling in upon him. His abdomen was bruised, his clavicle broken, and his head wounded. Beneath the wounded scalp, the right parietal bone was found fractured and depressed. He was slightly comatose for many hours after being brought to the hospital, yet answered rationally to those questions that were put to him. As the coma, however, remained, and his pulse did not beat with the freedom that is usual, the surgeon under whose care he was admitted, thought it right to trephine him. Accordingly, one perforation being made, the depressed bone was elevated. No blood was found upon the dura mater, nor did any thing indicate the propriety of using the trephine a second time.

The patient was largely bled ; and saline medicines, with antimony and opium, were given. As he complained much of pain in his belly, fomentations were applied to this part, and clysters administered occasionally. He was again bled on the second and fourth days after the operation. At the end of a week the antimony was omitted, on account of his weakness ; and he seemed to get rather better, until December 7, twelve days after the accident, when a hernia cerebri appeared, rising through an aperture in the dura mater, opposite to the perforation in the skull. It increased rapidly in size, and exhibited the same appearance described in the foregoing case.—Two days after this the patient died.

“ On examining the head, the dura mater was found everywhere adherent to the skull ; but on its inner layer there was a secretion of pus. The hernia cerebri, which had pushed up through an ulcerated opening in the dura mater, was of a fibrous texture, and evidently formed of congealed blood deposited in the medullary part of the cerebrum ; the containing cavity being about an inch diameter, and its parietes appearing to be the substance of the brain condensed by pressure. I was equally unsuccessful here in my search after the vessel, whence the blood had issued. The ventricles of the brain were full of a serous fluid mixed with blood, and a large abscess was also found in the spleen.—In this case, the mental faculties were not deranged as in the former. Both the

symptoms and dissections shew the disease to have consisted in the effects of concussion, with inflammation of the dura mater, and subsequent effusion into the ventricles of the brain.”

---

*Duo exempla subjecta e literis Doctoris Vose excipiuntur.*

#### EXEMP. I.

July 22d 1808, a boy about six years of age was brought into Guy's Hospital for an injury of the head; he had fallen from a considerable height, and in his descent struck his head against a projecting beam: he was taken up insensible, and remained in that state when received into the hospital; he had vomited incessantly from the time of the accident; his respiration was laborious, but without stertor, his pulse fuller than natural, and intermitting, his pupils somewhat contracted. Mr. Forster, under whose care the boy was brought into the hospital, concluding from the symptoms that the brain was compressed, made an incision through the bruised integuments, and traced a fracture backwards, from the lower and anterior angle of the parietal bone, for several



inches along its inferior edge. The boy, during this part of the operation gave signs of acute feeling, and was with some difficulty held steady. Mr. Forster made the usual preparations for the trepan, and placed his perforator about the middle of the fracture, carrying it to an alarming depth through the bone; the trepan being then applied and the portion of bone removed, a small hole was distinctly seen in the centre of the exposed dura mater; through this a small quantity of florid blood issued. The membrane puffing out remarkably, Mr. F. was induced to conclude that the blood beneath was the cause of the compression; under this conviction he introduced his lancet into the central hole, and made two incisions into the dura mater at right angles with each other, and extending to the circumference of the bone. No blood followed these incisions except what sprung from the wounded vessels of the pia mater, which lay in close contact with the dura mater. The boy was not immediately relieved by the operation; but the symptoms of coma, &c. gradually subsided, nature conspiring with considerable local and general bleeding. To this, great restlessness succeeded; the pupils became dilated, and the boy at intervals muttered incoherently. Next day pulse 85, boy restless—skin not warmer than natural—pupils as last mentioned. The boy


mistook Dr. Vose for his mother, and asked some unintelligible questions, yet informs the nurse of his wants : there was little alteration of symptoms during this day. July 24th, restless and perturbed during the last night ; bowels open, skin cool, cries much for his mother ; when Dr Vose held a bunch of currants within his reach, he stretched out his hand to take it, but could not direct it properly ; when possessed of the currants he was unable to guide his hand to his mouth—pulse 83, respiration easy—cannot be prevailed on to put out his tongue—8 ounces of blood were taken from the jugular vein. The dressings being removed to day for the first time, a *tumour* is found completely filling up the trepan hole and projecting to a level with the integuments—it is convex and irregular, and expands towards its base, without apparent membranous covering, and in every respect resembles a portion of the brain, bedewed with pus and spotted with coagulable lymph. Mr. Cooper, who was present when the dressings were removed, advised pressure by adhesive straps ; lint being placed underneath : the boy did not suffer any inconvenience from this treatment. July 25th, the patient is much as yesterday—has slept little last night—the tumour has not risen higher, nor altered its appearance ; gentle pressure by lint and straps was continued. July 26th, the boy has slept more last night

than he had before done—he occasionally cries and is very restless—skin quite cool—pulse 126, and small—the tumour appears diminished by the pressure, but in other respects preserves its general character—the boy was in the afternoon quite delirious. July 27th; the patient has passed a bad night with frequent startings, and cries; to day is more calm and rational—pulse 112, and small—skin cool—bowels open—the tumour diminishing—pulse at night 108, and fuller—pupils apparently natural—the child answers more collectedly to interrogation; when asked where he feels pain, lays his hand over the tumour. July 29th; not as well as yesterday—skin cool—pulse 96—pupils natural—the tumour is not one third the size it was when first observed—its surface is still tuberculated, the prominent parts now appearing pale, red and granular; and the interstices medullary and covered with pus; small quantities of which ooze out by the side of the tumour. July 30—The boy is sensible—skin cool—pulse 102—pressure continued—31st. boy still more rational—pulse 96—skin cool—tongue clear—bowels open—tumour smaller. August 1st—Boy much as yesterday—considerable protrusion of the tumour takes place upon the crying or coughing of the child, while the pressure is removed; pulsation of the brain communicates a distinct motion to the tumour—a tea-spoonful of pus was discharged from the side of the tumour, pulse quick.

Aug. 2d ; boy sensible, and complaining of pain over his eyes when exposed to light—pulse quiet—skin cool—bowels open. Aug. 3d ; pain from light not remarkable. Aug. 4th ; tumour almost entirely subsided—boy sits up in bed. Aug. 8th ; boy apparently in good health ; has a good appetite, and is allowed to eat what he pleases—tumour much contracted and subsided to a level with the dura mater—is covered with florid granulations which appear continuous with those covering the whole wound. The boy now improved rapidly—the wound, contracted by adhesive straps, soon cicatrized, and he was discharged from the hospital perfectly recovered. The cicatrix could be seen gently elevated at each pulsation of the brain ; the pressure made upon the tumour, during the progress of the cure, never excited any unpleasant nervous symptoms.

## EXEMPLUM II.

A boy about three years old was received into the Liverpool Infirmary in September 1809. He had been kicked by a horse in the centre of the forehead—a portion of the frontal bone was entirely detached by the blow ; and some of the fractured pieces remaining were considerably depressed. The boy was taken to the infirmary in a state



2



View of the side of the same from the left side. The same  
2. View of the same from the front. The same.



of insensibility. Mr Forshaw (one of the surgeons of the institution) raised the depressed pieces of bone by means of the elevator; in doing which, he observed a very small spicula of bone sticking in the dura mater; he extracted it, and found it had completely perforated the membranes. The boy recovered his senses when the compression was removed by the elevation of the depressed bones. Light dressings were applied, and the patient appeared to be doing very well, until three days after the accident; when a tumour resembling brain was observed rising above the dura mater; to this an antiseptic lotion was ordered. The tumour continued to increase gradually—a poultice was then applied—the patient was once convulsed during this period. When Dr. Vose first saw the patient October 14th 1809, in company with Dr. Lyon and Mr. Forshaw, the tumour was of the size represented in the sketch\*,

---

FIGURA PRIMA, tabulae oppositae tumorem repraesentat, qualis apparuit in exemplo Herniae Cerebri supra enarrato.

FIGURA SECUNDA, tumorem ostendit, qui sensim assurrexit e capitis integumentis cuidam foeminae, nuper apud Valetudinarium Regium Edinense: tumor summo dextri ossis parietis incubuit, mollis et vi resiliendi donatus, et ejus magnitudinis, quam figura exhibet: ejus superficies inaequalis fuit et granata: partes, quae maxime prominebant, sordidae humorem foetidum, acrem et cruentum effuderunt: pressura nihil praestitit: aegrae sexagenariae integumenta hinc quadriennio ictu laesa sunt; sed mensibus abhinc duodeviginti, primo tumorem percepit, in parte ante percussa; qui quadraginta duobus hinc diebus

it was then very similar in its external character to the *Hernia Cerebri*, which he had before seen in Guy's hospital, (see case preceeding) resembling brain with pus and coagulable lymph upon its surface, where there was also a small sloughy spot. The child appeared pale and thin—The tumour being at this time covered with poultice, Dr Vose suggested the plan of treatment prosecuted at the suggestion of Mr A. Cooper in the case just quoted, viz. gentle compression by lint and adhesive straps—this was adopted and the boy suffered no inconvenience from the pressure. It was at first, however, not effectual in restraining the growth of the tumour from its being applied with less care than afterwards; the tumour, therefore, for some time continued to increase, it spread a considerable circumference over the scalp, and looked foul and sloughy—in this state it continued, to all appearance, stationary for some

---

*exulceratus postea celerrime increvit. Tumor excisus extra pericranium jacuisse compertus fuit, hac membrana integra. Incisus, fabricam mollem et spongiosam habere videbatur, intus coloris fusci et Fungum Haematodem natura simulare habitus. Vulnus cito sanescere coepit; et aegra, quatuordecim diebus elapsis, Valetudinarium reliquit. Quoniam multum dubii necesse est horum tumorum sedem et naturam ante obscuret quam incidantur, qui false haberi possunt pro Fungis Duræ matris, aut aliis vitiis membranarum aut cerebri, duxi satius Figuram supra dictam et descriptionem adjicere, ad melius naturam talium tumorum illustrandam.*



time longer, when the pressure being better adjusted it began to decline: the discharge was copious: small sloughs occasionally fell off, and granulations formed in the edge of the surrounding scalp. The tumour was soon reduced to a level with the dura mater, and the granulations from the skin closed over it. The child during the progress of the cure was getting strong and healthy; it eat heartily; was suffered to run about the ward, and occasionally into the garden of the infirmary. The child had convulsions once during the treatment by pressure; but Dr. Vose suspects from irritation in the primae viae, as they continued but a short time and never recurred.

---

*Exempli secuturi historiam mecum comiter communi-  
cavit Doctor Henricus Hardie, Glasguensis. Hic Cerebrum  
videtur protrudi, et late exulcerari; fortasse propter con-  
ditionem propriam corporis: aegra enim simul malo veneris  
affecta hydrargyro large utebatur. Hujus mali eventus  
fuit, qualem similia habere solent, nullis remediis cohibita.  
Vide P. 63, hujus disputationis.*

Janet Russel aged 53, married. Admitted into the  
Glasgow Infirmary 23d September, 1807.

Towards the posterior part of the right parietal bone  
are two ulcers, separated by a narrow slip of undermined  
and diseased scalp; the one sore is the size of a sixpence;  
the other of a crown; around both, the scalp is detach-  
ed from the bone, which is carious, but immoveable be-  
neath the ulcers. The matter discharged is yellow, but  
very foetid.

In the right ham there is a large ulcer, with sinuses  
stretching thence towards the knee-joint, which is stiff, and  
half bent: there is also a sore on the chin and another  
above the left clavicle.

The sore in the ham appeared eight months ago;  
those on the head seven.

For sixteen years, she has been troubled with pains along the bones increased by heat. Twelve years ago had a sore in the palate which healed under the use of mercury. At present there is no disease perceptible in the throat, and she denies ever having had the primary symptoms of lues venerea. She was ordered to use mercurial frictions on the thighs; her mouth soon became violently affected, and continued moderately so till the middle of November; though she had rubbed in only ʒvij of mercurial ointment. The ulcers in the ham and head improved, and the others healed.

15th November—The whole of the carious bone has been removed; the dura mater looked sloughy, but is now a little red at the edge of the sore. No pulsation in the brain is perceptible.

Curet. Ulc. Unguent simplic.

20th.—Ulcer less foul, and all the exposed dura mater begins to granulate.

R̄ Infus. Amari ʒvi

TR. Amar. ʒij. m. et sumat ʒfs. ter indies.

5th December—Bone still carious in many points, and the scalp undermined. Pulsation of the brain very manifest.

14th—The granulations at the upper part of the sore unite to the hairy scalp, but those below are rather

foul—pulsation still evident—is troubled with cold shiverings, and health declines.

Sumat. ℥ss. Mistur. Amar. antea praescript.

17th— For some days past has complained of excessive pain on the right side of the head, at its upper part: occasional rigors; nausea; tongue foul—*on the fore part, the dura and pia mater have sloughed off, and the brain has risen nearly as high as the scalp.* Mercury omitted for some days (she has rubbed in, in all 5ix)—left hand paralytic.

Omitt<sup>r</sup>. omnia medicam.

Hab<sup>t</sup>. pauxill. vin dilut. subinde.

24th — The protrusion of the brain increases; the nausea is abated, and instead of rigors there is a sense of a creeping motion on the skin; occasional delirium and a tendency to paralysis in the left side. In the centre of the protruded part, there is a hole in which the probe passes  $1\frac{1}{2}$  inch deep, which it does also at the edges—bowels costive.

After this period the weakness increased—the protrusion enlarged with a foetid discharge from the parts, and most troublesome pains through the whole legs and thighs. She became unable to move her body, and could not put out her tongue; but the power of motion was less in the left than in the right side. On the 30th December,

the delirium continued—the bowels were torpid, and the weakness evidently increasing with the delirium. The protrusion became larger than an apple, and black on its surface. She tore off part of it that day, and all of it which projected above the scalp, the day following: the act was each time succeeded by the flow of an ounce or two of blood; afterwards she became more lively and asked for food. The probe could every day be further and further introduced into the brain. The bowels were with difficulty moved. On the 2d January, part of the protrusion spontaneously separated; and that day there was less delirium, but the mouth was observed to be twisted towards the right side. Next day after smart purgatives, she vomited, and purged, and dozed much, with strabismus. The probe passed downwards five inches. She was now less lively, and seemed to have no anxiety about the appearance of the sore, concerning which she had hitherto never failed to enquire.

5th January—More dozing—has had several severe tremors—the protrusion the size of an orange—yesterday of the colour of brain—to day black and foetid; next day this part separated, and was followed by a discharge of matter resembling “dissolved brain”—the pulse became more quick and feeble—there was rattling in the throat—

the eyes became fixed—she continued to sink, and on the morning of the 7th expired.

DISSECTION.—On removing the skull-cap, it was found that the dura mater adhered to the edges of the hole in the bone nearly all round—the external table of the skull was carious, and several parts of the diploë in a state of suppuration for half an inch around.

At the anterior-inferior part of the sore, the edges of the internal table were carious, and all around it seemed porous, soft and bloody—on the corresponding part of the parietal bone there was a similar appearance.

At one part of the ulcer, a portion of the bone, of the size of a sixpence, was thickened and softened, so that pressure forced a bloody fluid to exude. The hole in the bone lay over the middle branch of the meningeal artery, which must have been eroded. On each side of the spina frontalis was a small exostosis. The furrows between the convolutions of the brain contained a coagulum, soft and in colour resembling pus. This matter was formed over the whole surface of the brain. Beneath the cerebellum, and about the medulla oblongata, was formed a good deal of water mixed with purulent fluid.

From above, the ulceration had proceeded into the substance of the brain, entered the anterior horn of the right lateral ventricle; part of the corpus striatum and

thalamus opticus had been destroyed by ulceration, which had nearly entered the inferior horns of the ventricle. Here there was found the kind of matter which had flowed from the sore, resembling dissolved brain.

No further disease was found, except a hydatigenous appearance in the choroid plexus of the opposite ventricle.

FINIS.

The following is a list of the names of the persons who have been  
 named in the various reports of the Commission on the  
 subject of the proposed amendments to the Constitution.  
 The names are given in the order in which they were  
 mentioned in the reports.

- 1. Mr. [Name]
- 2. Mr. [Name]
- 3. Mr. [Name]
- 4. Mr. [Name]
- 5. Mr. [Name]
- 6. Mr. [Name]
- 7. Mr. [Name]
- 8. Mr. [Name]
- 9. Mr. [Name]
- 10. Mr. [Name]
- 11. Mr. [Name]
- 12. Mr. [Name]
- 13. Mr. [Name]
- 14. Mr. [Name]
- 15. Mr. [Name]
- 16. Mr. [Name]
- 17. Mr. [Name]
- 18. Mr. [Name]
- 19. Mr. [Name]
- 20. Mr. [Name]
- 21. Mr. [Name]
- 22. Mr. [Name]
- 23. Mr. [Name]
- 24. Mr. [Name]
- 25. Mr. [Name]
- 26. Mr. [Name]
- 27. Mr. [Name]
- 28. Mr. [Name]
- 29. Mr. [Name]
- 30. Mr. [Name]
- 31. Mr. [Name]
- 32. Mr. [Name]
- 33. Mr. [Name]
- 34. Mr. [Name]
- 35. Mr. [Name]
- 36. Mr. [Name]
- 37. Mr. [Name]
- 38. Mr. [Name]
- 39. Mr. [Name]
- 40. Mr. [Name]
- 41. Mr. [Name]
- 42. Mr. [Name]
- 43. Mr. [Name]
- 44. Mr. [Name]
- 45. Mr. [Name]
- 46. Mr. [Name]
- 47. Mr. [Name]
- 48. Mr. [Name]
- 49. Mr. [Name]
- 50. Mr. [Name]
- 51. Mr. [Name]
- 52. Mr. [Name]
- 53. Mr. [Name]
- 54. Mr. [Name]
- 55. Mr. [Name]
- 56. Mr. [Name]
- 57. Mr. [Name]
- 58. Mr. [Name]
- 59. Mr. [Name]
- 60. Mr. [Name]
- 61. Mr. [Name]
- 62. Mr. [Name]
- 63. Mr. [Name]
- 64. Mr. [Name]
- 65. Mr. [Name]
- 66. Mr. [Name]
- 67. Mr. [Name]
- 68. Mr. [Name]
- 69. Mr. [Name]
- 70. Mr. [Name]
- 71. Mr. [Name]
- 72. Mr. [Name]
- 73. Mr. [Name]
- 74. Mr. [Name]
- 75. Mr. [Name]
- 76. Mr. [Name]
- 77. Mr. [Name]
- 78. Mr. [Name]
- 79. Mr. [Name]
- 80. Mr. [Name]
- 81. Mr. [Name]
- 82. Mr. [Name]
- 83. Mr. [Name]
- 84. Mr. [Name]
- 85. Mr. [Name]
- 86. Mr. [Name]
- 87. Mr. [Name]
- 88. Mr. [Name]
- 89. Mr. [Name]
- 90. Mr. [Name]
- 91. Mr. [Name]
- 92. Mr. [Name]
- 93. Mr. [Name]
- 94. Mr. [Name]
- 95. Mr. [Name]
- 96. Mr. [Name]
- 97. Mr. [Name]
- 98. Mr. [Name]
- 99. Mr. [Name]
- 100. Mr. [Name]







